

ABOCA FITOMAGRA LIBRAMED GRANULARE GUSTO ARANCIA E PESCA 40 BUSTINE DA 2,35 G

Marchio: Aboca
Codice Min.: 970208157
Link: [clicca qui per acquistare](#)

ABOCA FITOMAGRA LIBRAMED GRANULARE GUSTO ARANCIA E PESCA 40 BUSTINE DA 2,35 G



Utile per il trattamento del sovrappeso, dell'obesità e per la riduzione della circonferenza ombelicale. E' un complesso brevettato di macromolecole polisaccaridiche, naturale al 100%. Controlla i picchi glicemici, riducendo l'accumulo di grassi e il senso di fame.

Libramed, grazie al suo complesso brevettato Policaptil Gel Retard®, agisce controllando i picchi glicemici, riducendo l'accumulo dei grassi e il senso di fame.

Grazie a questo meccanismo d'azione Libramed, in associazione ad una

dieta equilibrata e ad una regolare attività fisica, favorisce la riduzione del peso e della circonferenza ombelicale ed è pertanto indicato per:

Adulti:

- In caso di sovrappeso e obesità;
- Con elevati valori di circonferenza ombelicale, anche normopeso;

Bambini a partire da 8 anni di età:

- In caso di sovrappeso e obesità.

Come agisce:

Libramed controlla i picchi glicemici dopo pasto, rendendo la concentrazione di glucosio e insulina nel sangue più costante, così da ridurre la lipogenesi (accumulo di grasso negli adipociti) e il senso di fame. L'azione di Libramed è dovuta a Policaptil Gel Retard®, un complesso brevettato di macromolecole polisaccaridiche che, grazie all'azione sinergica dei suoi componenti, è dotato di un elevato potere gelificante. Policaptil, infatti, dà luogo nell'intestino alla formazione di un gel che agisce sui carboidrati, riducendone la quantità assorbita e la velocità di assorbimento (effetto retard). Grazie alle proprietà di questo gel, Libramed agisce anche limitando l'assorbimento dei grassi, riducendo la sonnolenza postprandiale, favorendo il transito intestinale e regolarizzando la consistenza delle feci.

Modo d'uso:

Assumere una bustina di Libramed granulare prima dei due pasti principali, aggiungendo al contenuto

della bustina 100ml di acqua (pari a mezzo bicchiere). Mescolare accuratamente fino all'ottenimento di una buona dispersione. Assumere subito dopo. Al termine bere un ulteriore bicchiere d'acqua.