

ABOCA LIBRAMED 138 COMPRESSE DA 725 MG

Marchio: Aboca
Codice Min.: 931445148
Link: [clicca qui per acquistare](#)

ABOCA LIBRAMED 138 COMPRESSE DA 725 MG



Utile per il trattamento del sovrappeso, dell'obesità e per la riduzione della circonferenza ombelicale. E' un complesso brevettato di macromolecole polisaccaridiche, naturale al 100%. Controlla i picchi glicemici, riducendo l'accumulo di grassi e il senso di fame. Libramed, grazie al suo complesso brevettato Policaptil Gel Retard®, agisce controllando i picchi glicemici, riducendo l'accumulo dei grassi e il senso di fame. Grazie a questo meccanismo d'azione Libramed, in associazione ad una dieta equilibrata e ad una regolare attività fisica, favorisce la riduzione del peso e della circonferenza ombelicale ed è pertanto indicato per:

Adulti:

- In caso di sovrappeso e obesità;
- Con elevati valori di circonferenza ombelicale, anche normopeso;

Bambini a partire da 8 anni di età:

- In caso di sovrappeso e obesità.

Come agisce:

Libramed controlla i picchi glicemici dopo pasto, rendendo la concentrazione di glucosio e insulina nel sangue più costante, così da ridurre la lipogenesi (accumulo di grasso negli adipociti) e il senso di fame. L'azione di Libramed è dovuta a Policaptil Gel Retard®, un complesso brevettato di macromolecole polisaccaridiche che, grazie all'azione sinergica dei suoi componenti, è dotato di un elevato potere gelificante. Policaptil, infatti, dà luogo nell'intestino alla formazione di un gel che agisce sui carboidrati, riducendone la quantità assorbita e la velocità di assorbimento (effetto retard). Grazie alle proprietà di questo gel, Libramed agisce anche limitando l'assorbimento dei grassi, riducendo la sonnolenza postprandiale, favorendo il transito intestinale e regolarizzando la consistenza delle feci.

Modo d'uso:

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni : 3 compresse prima dei due pasti principali.

Bambini tra 8 e 12 anni: 2 compresse prima dei due pasti principali.

Assumere la dose indicata con un abbondante bicchiere di acqua avendo cura di ingerire una compressa per volta. Non masticare e non rompere la compressa con i denti. Per chi ha problemi di

deglutizione è possibile sciogliere le compresse di Libramed in acqua tiepida o in tisane non zuccherate, agitando fino a completa dissoluzione. La bevanda che si ottiene deve essere ingerita entro pochi minuti, prima che si formi il gel.

Avvertenze:

Per coloro che hanno problemi di deglutizione è sconsigliata l'ingestione diretta delle compresse che dovranno essere preventivamente sciolte come riportato nel modo d'uso. Si consiglia di assumere il prodotto ad almeno due ore dall'assunzione di farmaci o integratori vitaminici, per non interferire con il loro assorbimento. Non assumere in gravidanza e in allattamento. Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti.

Composizione:

Complesso brevettato di macromolecole polisaccaridiche (Policaptil Gel Retard); Aromi di Arancio, Mela e Limone.