


## ACIDIF CV COMPRESSE VAGINALI 10 PEZZI

**Marchio:** Biohealth Italia  
**Codice Min.:** 904309945  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

### ACIDIF® CV COMPRESSE VAGINALI 10 PEZZI



Dispositivo medico, in compresse vaginali, da utilizzarsi in tutti i casi di temporanea alterazione dell'equilibrio microbico uro-vaginale. Trattamento delle vaginosi e vaginiti batteriche.

#### Modalità d'uso:

Si consiglia di utilizzare 1 compressa vaginale, preferibilmente la sera, prima di coricarsi, per una settimana di trattamento. La compressa integra, deve essere introdotta in vagina, fino in profondità, in modo da favorirne la rapida disgregazione. Seguire le modalità di utilizzo iniziando il trattamento una settimana prima del ciclo mestruale e/o immediatamente dopo la sua fine. Non prolungare il trattamento per oltre 14 giorni senza prima avere consultato il proprio ginecologo.

#### Caratteristiche:

Una compressa contiene batteri lattici (*Lactobacillus acidophilus*), acido lattico ed isoflavoni di soia. La sua particolare composizione consente, una volta sciolta in vagina, di liberare entro pochi minuti batteri lattici ed acido lattico i quali contribuiscono ad abbassare il pH vaginale a valori di acidità tra 4 e 4,5 contrastando l'aggressione e lo sviluppo della microflora patogena. Gli isoflavoni di soia presenti nella compressa sono fitoestrogeni naturali che determinano un incremento della percentuale di acido lattico presente nella mucosa vaginale contribuendo all'abbassamento del pH, e quindi al benessere dell'ambiente vaginale.

#### Avvertenze:

Non assumere il prodotto insieme ad altri dispositivi e/o farmaci per uso vaginale, senza avere consultato il proprio ginecologo. Il dispositivo non ha evidenziato effetti irritanti a livello locale, ma nel caso in cui si manifesti ipersensibilità al prodotto consultare immediatamente il proprio medico. In casi occasionali, soprattutto nelle prime giornate di trattamento, può manifestarsi la comparsa di prurito, che tende tuttavia a scomparire nei successivi 2-3 giorni di trattamento.