





Modo d'uso:

Per ottenere un Gel:

1. Versare il contenuto di una bustina di Afenil Gel in un bicchiere. Se desiderato, aromatizzare a piacere.
2. Aggiungere circa 30 ml di acqua fredda. Mescolare bene per circa 10 secondi.
3. Per ottenere un gel cremoso, lasciar riposare per circa 2 minuti.

Afenil Gel ricostituito può essere assunto così come tale con un cucchiaino o mescolato ad altri alimenti permessi. Per un miglior risultato, quando possibile, Afenil Gel dovrebbe essere preparato e consumato immediatamente.

Ove necessario, il prodotto ricostituito può essere conservato 24 ore in frigo e rimescolato bene prima dell'uso.

Per ottenere una bevanda:

1. Versare il contenuto di una bustina di Afenil Gel in un bicchiere. Se desiderato, aromatizzare a piacere.
2. Aggiungere circa 80 ml di acqua fredda. Mescolare bene per circa 10 secondi.
3. Bere immediatamente.

La polvere contenuta in una busta, una volta aperta, dovrebbe essere interamente consumata. Eventuale eccesso dovrebbe essere conservato in frigo ed usato entro 24 ore.

Dosaggio: secondo prescrizione medica, tenendo conto dell'età del paziente, del peso corporeo, del grado di fenilalaninemia e delle condizioni cliniche del paziente.