

AFTOX COLLUTORIO 100 ML

Marchio: Drexpharma
Codice Min.: 931399644
Link: [clicca qui per acquistare](#)

AFTOX COLLUTORIO 100 ML



AFTOX COLLUTORIO è indicato in tutte le lesioni del cavo orale e nei processi infiammatori correlati. Tramite il suo effetto barriera, favorisce la cicatrizzazione delle ferite con conseguente senso di sollievo e riduzione marcata del dolore. Il prodotto trova applicazione in: parodontopatie, stomatiti, afte e candidosi. È inoltre indicato nei pazienti sottoposti a piccoli interventi chirurgici, quali chirurgia estrattiva, impianti e lembi parodontali. AFTOX COLLUTORIO è indicato anche nel preintervento perché in grado di proteggere dalla contamina-

zione batterica: prove di laboratorio hanno evidenziato una riduzione del 97% della carica batterica nel cavo orale. L'uso anche prolungato del prodotto non causa effetti collaterali, ma contribuisce ad un'accelerazione nei processi di cicatrizzazione della mucosa orale. E' ben tollerato, non brucia, non contiene alcool, non irrita, non fa ingiallire i denti anche nei trattamenti prolungati.

Modo d'uso

AFTOX COLLUTORIO va utilizzato 2-3 volte al giorno non diluito (da 5 ml a 10 ml di prodotto). Per permettere al prodotto di agire adeguatamente, si consiglia di non risciacquare il cavo orale dopo l'uso.

Ingredienti

Acqua Depurata, Glicole Propilenico, Copolimero Di Polietilene Glicole-150, Decil Alcool E Metilene Difenildiisocianato Saturato, Perossido Di Idrogeno, Ricino Olio Idrogenato(40)Oe, Copolimero Idrossietil Acrilato/Sodio Acriloidimetil Taurato, Disuccinato Trisodico Dell'etilenediammina, Gomma Xantana, Aroma Menta, Acido Ialuronico Idrolizzato, Acido Lattico, Saccarina Sodica, Sodio Jaluronato, Copolimero Di Vinilpirrolidone, Dimeticonolo Acrilato E Poliuretano, Copolimero Di Vinilpirrolidone E Poliuretano, Acido Aspartico, Cloruro Di Sodio, Bromuro Di Sodio.

Avvertenze

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota ad uno o più componenti. Solo per uso esterno. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di irritazione o bruciore persistenti, o in assenza di miglio-

ramenti dopo un utilizzo prolungato, sospendere l'uso e consultare il medico. Dopo l'uso richiudere accuratamente il tappo. Non introdurre acqua nel flacone. In caso di ingestione involontaria di consistenti quantità, rivolgersi ad un medico e mostrare l'etichetta.

Formato

Flacone da 100 ml.