

ALLERGAN*crema derm 30 g 2 g/100 g

Marchio: ALLERGAN
Codice Min.: 001740063
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE ALLERGAN 2G/100 G CREMA **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Antiallergici-antistaminici. **PRINCIPI ATTIVI** 100g di crema contengono: difenidramina cloridrato g. 2 **Eccipienti** con effetto noto: lanolina, metile p-idrossibenzoato (E218), propile p-idrossibenzoato (E216). Per gli eccipienti vedi 6.1. **ECCIPIENTI** Acido stearico, glicerina, lanolina, trietanolamina, metile p-idrossibenzoato (E218), propile p-idrossibenzoato (E216), acqua distillata. **INDICAZIONI** Trattamento sintomatico locale di dermatiti pruriginose, eritema solare, punture di insetti. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita'

nota verso i componenti e verso altri antistaminici di analoga struttura chimica. Bambini al di sotto dei 2 anni. **POSOLOGIA** Spalmare un sottile strato sulla parte interessata, 2 o 3 volte al giorno. Non superare le dosi consigliate. **CONSERVAZIONE** Nessuna. **AVVERTENZE** Non utilizzare con bendaggio occlusivo. L'impiego del prodotto, specie se prolungato, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; ove ciò si verifici interrompere il trattamento e consultare il medico. Applicare la crema su zone ridotte della pelle. ALLERGAN Crema non va applicata su zone della pelle con vesciche, su piaghe vive e superfici in via di cicatrizzazione. Evitare il contatto con gli occhi o altre membrane mucose. Nel caso di eritema solare non esporre successivamente la pelle al sole. Se dopo un breve periodo di trattamento non si notasse alcun miglioramento o se si manifestassero eruzioni cutanee, fenomeni di irritazioni e bruciori, sospendere il trattamento e rivolgersi al medico. Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini. Informazioni importanti su alcuni eccipienti: questo medicinale contiene: lanolina: può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatite da contatto). Metile p-idrossibenzoato (E218) e propile p-idrossibenzoato (E216): possono causare reazioni allergiche (anche ritardate). **INTERAZIONI** Nessuna nota. **EFFETTI INDESIDERATI** Sono stati riscontrati bruciori, eruzioni cutanee, reazioni di fotosensibilità. Segnalazione di reazioni avverse sospette: la segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse> **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Nelle donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento il prodotto va usato solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.