

## ALLERGODIL\*collirio 6 ml 0,05%

**Marchio:** Meda Pharma  
**Codice Min.:** 028310035  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE** ALLERGODIL 0,5 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Altri antiallergici. **PRINCIPI ATTIVI** Azelastina cloridrato 0,05% (0,5 mg/ml). Ogni goccia contiene 0,015 mg di azelastina cloridrato. **ECCIPIENTI** Benzalconio cloruro, edetato disodico, ipromellosa, sorbitolo liquido (cristallizzato), sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. **INDICAZIONI** Trattamento e prevenzione dei sintomi delle congiuntiviti allergiche stagionali in adulti e bambini dai 4 anni in poi. Trattamento dei sintomi delle congiuntiviti allergiche non stagionali (perenni) in adulti e bambini dai 12 anni in poi. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSOLOGIA** Congiuntiviti allergiche stagionali: il dosaggio abituale in adulti e bambini dai 4 anni in poi e' di

una goccia per occhio, due volte al di' che puo' essere aumentato, se necessario, fino a quattro volte al di'. Se l'esposizione agli allergeni e' anticipata, questo farmaco va somministrato in via profilattica prima dell'esposizione. Congiuntiviti allergiche non stagionali (perenni): il dosaggio abituale in adulti e bambini dai 12 anni in poi e' di una goccia per occhio due volte al di', che puo' essere aumentato, se necessario, fino a quattro volte al di'. Poiche' sicurezza ed efficacia sono state dimostrate in studi clinici per periodi fino a 6 settimane, la durata di ogni trattamento deve essere limitata ad un periodo massimo di 6 settimane. **CONSERVAZIONE** Questo medicinale non richiede alcuna speciale precauzione per la conservazione. **AVVERTENZE** Questo medicinale non e' indicato per il trattamento di infezioni oculari. Questo farmaco contiene il conservante benzalconio cloruro. Il benzalconio cloruro puo' causare irritazione agli occhi, specialmente in caso di occhi secchi o di alterazioni della cornea. L'uso con le lenti a contatto morbide deve essere evitato. Togliere le lenti a contatto prima di applicare il collirio e attendere almeno 15 minuti prima di rimetterle. E' noto lo sbiadire delle lenti a contatto morbide. **INTERAZIONI** Non sono stati condotti studi specifici per valutare le interazioni con questo medicinale. Sono stati condotti studi di interazione con dosi elevate di azelastina per via orale, anche se non hanno rilevanza per questo farmaco, poiche', dopo somministrazione di gocce oculari, i livelli sistemici del farmaco sono situati nel range dei picogrammi. **EFFETTI INDESIDERATI** La valutazione degli effetti indesiderati e' basata sulle seguenti frequenze: molto comune ( $\geq 1/10$ ); comune ( $\geq 1/100$ ); a = 1/1.000; a = 1/10.000. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Fertilita': gli effetti sulla fertilita' nell'uomo non sono stati studiati. Gravidanza: non sono disponibili sufficienti informazioni per stabilire la sicurezza di azelastina nella gravidanza umana. A dosi elevate per via orale azelastina ha dimostrato di indurre reazioni avverse (morte fetale, ritardo dell'accrescimento e malformazioni scheletriche) nell'animale di laboratorio. L'applicazione locale oculare portera' ad una minima esposizione sistemica (nel range dei picogrammi). Tuttavia, l'impiego di questo farmaco durante la gravidanza dovra' essere effettuato con

precauzione. Allattamento: azelastina e' escreta nel latte in bassa quantita'. Per questa ragione, questo medicinale non e' raccomandato durante la lattazione.