

## AMUKINE MED\*soluz derm 250 ml 0,05%

**Marchio:** AMUKINE MED  
**Codice Min.:** 032192015  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE** AMUKINE MED 0,05% **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Antisettici e disinfettanti. **PRINCIPI ATTIVI** 100 ml di soluzione contengono: sodio ipoclorito 0,057 g (cloro attivo 0,055 g). **ECCIPIENTI** Cloruro di sodio, sodio idrato, sodio tetraborato decaidrato, acqua depurata. **INDICAZIONI** Disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni, etc.); disinfezione dei genitali esterni. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al sodio ipoclorito o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSOLOGIA** La soluzione cutanea si applica localmente, senza ulteriori diluizioni, mediante: lavaggio, bagno, irrigazione; compresse imbevute; bendaggi inumiditi. lo spray cutaneo si applica localmente, senza ulteriori diluizioni: applicando lo spray direttamente sull'area da trattare;

applicando lo spray su compresse di garza; applicando lo spray su bendaggi. Erogare lo spray fino a inumidire uniformemente l'area da trattare. Una singola erogazione equivale a 0,7 ml di soluzione. Ripetere le applicazioni secondo necessita'. Non superare le 6 applicazioni quotidiane. **CONSERVAZIONE** Conservare in ambiente fresco ed asciutto al riparo dalla luce solare diretta. Conservare a temperatura inferiore a 30 gradi C. Richiudere il flacone della soluzione dopo ogni uso. Per la confezione spray, dopo ogni uso reinserire il cappuccio di protezione sull'erogatore. **AVVERTENZE** Il prodotto e' solo per uso esterno. Non usare per i trattamenti prolungati. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale puo' avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare il contatto con gli occhi. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso, interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire un' idonea terapia. La presenza di materiali organici (proteine, siero, sangue) riduce l'attivita' dell'antisettico. L'applicazione topica del prodotto puo' dissolvere grumi di sangue e causare sanguinamenti. Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. **INTERAZIONI** Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti. **EFFETTI INDESIDERATI** Le soluzioni di ipoclorito possono essere irritanti per la cute: e' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione). Sono stati segnalati casi di dermatite allergica da contatto. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Non sono note controindicazioni all'uso in corso di gravidanza e allattamento.