

ANTISETTICO ASTRINGENTE SEDATIVO BRUSCHETTINI*collirio 10 ml

Marchio: BRUSCHETTINI
Codice Min.: 004894010
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONEANTISETTICO ASTRINGENTE SEDATIVO COLLIRIO, SOLUZIONE**CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICAProdotti oftalmologici, antimicrobici, solfonamidici.**PRINCIPI ATTIVI**100 ml contengono: zinco solfofenato g 0.500, sulfacetamide sodica g 3, nafazolina cloridrato g 0.005, lidocaina cloridrato g 0.750.**ECCIPIENTI**Ammonio cloruro, esteri p-ossibenzoici, sodio mertiolato, acqua depurata. **INDICAZIONI**Terapia delle congiuntiviti semplici.**CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDARI**ipersensibilita' ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti. Bambini di eta' inferiore ai 6 anni.**POSOLOGIA**Istillare 1 goccia, due o piu' volte al giorno, nel fornice congiuntivale inferiore. Dopo l'istillazione mantenere l'occhio chiuso per qualche istante. Attenersi scrupolosamente alle dosi consigliate. Un dosaggio superiore del prodotto anche se assunto per via topica e per breve periodo di tempo puo' dar luogo ad effetti sistemici gravi.**CONSERVAZIONE**Conservare a temperatura non superiore a 30 gradi C. Il prodotto non deve essere utilizzato oltre i 30 giorni dopo la prima apertura del contenitore.**AVVERTENZE**Non superare le dosi indicate. Non somministrare per oltre sette giorni consecutivi. Non somministrare a bambini di eta' inferiore a sei anni. Se compaiono fenomeni di sensibilizzazione interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea. Contiene sodio mertiolato: puo' causare reazioni allergiche. Contiene esteri para idrossi benzoici (metil-p-idrossibenzoato e propil-p-idrossibenzoato) che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).**INTERAZIONI**Non sono note.**EFFETTI INDESIDERATI**Non sono stati segnalati effetti indesiderati correlabili al farmaco.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Ogravidanza e allattamento . Nelle donne in gravidanza accertata o presunta e durante il periodo dell'allattamento, il prodotto va somministrato in caso di effettiva necessita', secondo il parere del medico.