

APTAMIL 2 LATTE 500 ML

Marchio: APTAMIL
Codice Min.: 980029247
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Aptamil 2 Latte di proseguimento dal 6° mese compiuto al 12° mese compiuto. Descrizione Aptamil 2 è un latte di proseguimento indicato a partire dal 6° mese compiuto per soddisfare le esigenze nutrizionali del lattante che cambiano con l'inizio dello svezzamento, periodo in cui l'alimentazione si diversifica e si completa settimana dopo settimana. Aptamil 2 è integrato con nucleotidi, LC-Pufa e una miscela esclusiva e brevettata di galatto-oligosaccaridi (GOS) e frutto-oligosaccaridi (FOS) (0,8g /100 ml). Gli oligosaccaridi sono sostanze naturalmente presenti nel latte materno e svolgono una funzione di nutrimento per la flora batterica già presente nell'intestino del bambino. Aptamil 2 contiene Pronutra+ una miscela esclusiva di ingredienti selezionati. Pronutra+ è arricchito dalle vitamine A, C e D che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario, olio di pesce e GOS/FOS. Aptamil 2 deve essere utilizzato

seguendo le indicazioni del Pediatra quando il latte materno manca o non è sufficiente. Dopo Aptamil 2, a partire dal 12° mese compiuto consultare il pediatra per proseguire l'alimentazione latte del bambino con Aptamil 3 Latte di Crescita. Ingredienti Acqua, latte scremato, lattosio, oli vegetali (palma, cocco, colza a basso contenuto di acido erucico, girasole), galatto-oligosaccaridi da latte (in polvere) 1,6%, siero di latte demineralizzato, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di soia; sieroproteine da latte, concentrato di sieroproteine da latte, frutto-oligosaccaridi 0,08%, olio di pesce, fosfato di calcio, regolatore di acidità: acido citrico, bicarbonato di potassio, citrato di potassio, idrossido di potassio, cloruro di potassio, acido L-ascorbico, olio estratto da Mortierella alpina, cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, idrossido di calcio, cloruro di colina, citrato di sodio, taurina, lattato ferroso, inositolo, ossido di magnesio, cloruro di magnesio, sodio Lascorbato, L-carnitina, solfato di zinco, uridina 5'-monofosfato sale sodico, citidina 5'-monofosfato, calcio D-pantotenato, antiossidante: ascorbil palmitato, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, acetato di DL-alfa-tocoferile, carbonato di calcio, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, riboflavina, acetato di retinile, cloridrato di tiammina, solfato rameico, cloridrato di piridossina, ioduro di potassio, acido folico, selenito di sodio, fitomenadione, solfato di manganese, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina. Caratteristiche nutrizionali Valori nutrizionali medi per 100 ml Energia 285 kJ 68 kcal Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - ac. linoleico (LA) - ac. alfa-linoleico (ALA) - ac. arachidonico (AA) - ac. eicosapentaenoico (EPA) - ac. docosaesaenoico (DHA) 3,2 g 1,4 g 1,2 g 0,7 g 519 mg 49,7 mg 8,8 mg 3,6 mg 17 mg Carboidrati di cui zuccheri - lattosio - inositolo 8,2 g 7,79 g 6,5 mg Fibre di cui GOS di cui FOS di cui 3'-Galattosil Lattosio 0,6 g 0,48 g 0,08 g 0,015 g Proteine - sieroproteine - caseine 1,4 g 0,5 g 0,8 g Vitamina A 60 mcg Vitamina D 1,7 mcg Vitamina E 0,81 TE mg Vitamina K 4,2 mcg Vitamina C 10,2 mg Tiammina (vitamina B1) 0,05 mg Riboflavina (vitamina B2) 0,15 mg Niacina 0,46 mg Vitamina B6 0,05 mg Folato 13 mcg Vitamina B12 0,19 mcg Acido pantotenico 0,49

mg Biotina1,8 mcg Calcio56 mg Fosforo40 mg Potassio88 mg Sodio25 mg Cloruro51 mg Ferro1 mg Zinco0,54 mg Iodio13 mcg Selenio3,3 mcg Rame0,054 mg Magnesio7 mg Manganese0,004 mg Fluoruro≤0,006 mg GOS (carboidrati non calorici)0,2 g Colina15 mg L-carnitina2 mg Taurina5,1 mg Citidina 5'-monofosfato0,79 mg Uridina 5'-monofosfato0,59 mg Adenosina 5'-monofosfato0,49 mg Guanosina 5'-monofosfato0,17 mg Inosina 5'-monofosfato0,33 mg

Modalità d'uso Preparare un solo biberon per volta e darlo al lattante appena pronto. Non bollire: il prodotto è sterile, già pronto per l'uso. Seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di conservazione inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante. Per la salute del tuo bambino consigliamo di seguire attentamente i consigli per una corretta igiene: prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera. Agitare la bottiglia e versare nel biberon la quantità di latte necessaria. Scaldare il prodotto fino a circa 40°C; prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso.

Avvertenze Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante ed è raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente latteo di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita. Se manca o è insufficiente si può utilizzare un latte di proseguimento solo su indicazione del pediatra. Aptamil Latte di proseguimento è indicato dopo il 6° mese e non deve essere utilizzato come sostituto del latte materno nei primi 6 mesi di vita ed è da intendersi come parte di un'alimentazione diversificata. L'inizio dello svezzamento deve avvenire unicamente seguendo le indicazioni del pediatra. Non riutilizzare l'eventuale latte avanzato. Formato Bottiglia da 500 ml. Cod. 149353