

ARGENTO PROTEINATO (MARCO VITI)*BB gtt orl 10 ml 0,5%

Marchio: MARCO VITI
Codice Min.: 030322010
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE ARGENTO PROTEINATO MARCO VITI **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Decongestionanti nasali ed altre preparazioni per uso topico. **PRINCIPI ATTIVI** Argento proteinato. **ECCIPIENTI** Acqua depurata, disodio fosfato dodecaidrato, potassio monobasico fosfato, bronopol. **INDICAZIONI** Decongestionante e antisettico della mucosa nasale e antiseptico del condotto auricolare. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSOLOGIA** Adulti e bambini: somministrare 1-2 gocce in ogni narice o nel condotto auricolare 2-3 volte al giorno. **CONSERVAZIONE** Conservare il flacone ben chiuso nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. **AVVERTENZE** Evitare l'uso

concomitante con prodotti a base di papaina. Attenersi alle dosi consigliate e alle modalita' di impiego. L'argento proteinato, se accidentalmente ingerito o se impiegato per un lungo periodo a dosi eccessive, puo' determinare fenomeni tossici. **INTERAZIONI** La soluzione di argento proteinato puo' interagire con prodotti a base di papaina. La papaina e' un enzima proteolitico, appartenente alla classe delle idrolasi, che si estrae dal frutto immaturo della papaya (Carica papaya). L'uso concomitante di argento proteinato e papaina potrebbe inibire l'azione enzimatica della papaina. **EFFETTI INDESIDERATI** Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati dell'argento proteinato, organizzati secondo la classificazione organo sistemica MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. **Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo:** dermatiti, rash, bruciori, irritazioni della cute, decolorazione della pelle, reazioni di ipersensibilita', argiria. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso dell'argento proteinato in donne in gravidanza. L'argento proteinato non deve essere usato durante la gravidanza, se non in caso di assoluta necessita'. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso dell'argento proteinato in allattamento. L'argento proteinato non deve essere usato durante l'allattamento, se non in caso di assoluta necessita'.