

ARGENTO PROTEINATO (NEW.FA.DEM.)*AD gtt orl 10 ml 2%

Marchio: NEW.FA.DEM. SRL
Codice Min.: 031044035
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE ARGENTO PROTEINATO NEW.FA.DEM. GOCCE NASALI E AURICOLARI, SOLUZIONE CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Preparazioni rinologiche. PRINCIPI ATTIVI Bambini 0,5% gocce nasali e auricolari, soluzione: 100 g di soluzione contengono argento proteinato 0,5 g. Adulti 1% gocce nasali e auricolari, soluzione: 100 g di soluzione contengono argento proteinato 1 g. Adulti 2% gocce nasali e auricolari, soluzione: 100 g di soluzione contengono argento proteinato 2 g. ECCIPIENTI Acqua depurata. INDICAZIONI Decongestionante e antisettico della mucosa nasale e antisettico del condotto auricolare. CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. POSOLOGIA Adulti e bambini. Somministrare 1-2 gocce in ogni narice o nel condotto auricolare 2-3 volte al giorno. CONSERVAZIONE Conservare ad una temperatura non superiore ai 30 gradi C. Conservare il flacone ben chiuso nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. AVVERTENZE Evitare l'uso concomitante con prodotti a base di papaina. Attenersi alle dosi consigliate e alle modalità di impiego. L'argento proteinato, se accidentalmente ingerito o se impiegato per un lungo periodo a dosi eccessive, può determinare fenomeni tossici. INTERAZIONI La soluzione di argento proteinato può interagire con prodotti a base di papaina. La papaina è un enzima proteolitico, appartenente alla classe delle idrolasi, che si estrae dal frutto immaturo della papaya (Carica papaya). L'uso concomitante di argento proteinato e papaina potrebbe inibire l'azione enzimatica della papaina. EFFETTI INDESIDERATI Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: dermatiti, rash, bruciori, irritazioni della cute, decolorazione della pelle, reazioni di ipersensibilità, argiria. Segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso di argento proteinato in donne in gravidanza. Argento proteinato non deve essere usato durante la gravidanza, se non in caso di assoluta necessità. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso di argento proteinato in allattamento. Argento proteinato non deve essere usato durante l'allattamento, se non in caso di assoluta necessità.