

## AZOLMEN\*gel 30 g 1%

**Marchio:** AZOLMEN  
**Codice Min.:** 026048102  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**D E N O M I N A Z I O N E A Z O L M E N C A T E G O R I A**  
**FARMACOTERAPEUTICA** Antimicotici per uso topico. **PRINCIPI**  
**ATTIVI** Bifonazolo. **ECCIPIENTI** Crema: sorbitano monostearato;  
polisorbato 60; spermaceti; alcool cetilstearylco; ottildodecanolo;  
alcool benzilico; acqua depurata. Gel: miscela di alcoli grassi  
etossilati; gliceridi di acidi grassi etossilati; isopropilisostearato;  
alcool etilico; acido lattico; alcool benzilico; acqua depurata.  
Soluzione cutanea: etanolo; isopropilmiristato. Polvere cutanea  
amido di riso non gelificabile. **INDICAZIONI** Crema, gel e  
soluzione cutanea: dermatomicosi sostenute da dermatofiti (ad  
es. tricofiti), da saccaromiceti (ad es. Candida) e da altri funghi

patogeni (ad es. Malassezia furfur). Dermatomi da sovrainfezioni sostenute dai suddetti funghi patogeni e da germi sensibili al farmaco. Nell'ambito di queste affezioni sono comprese micosi plantare e interdigitale della mano e del piede (piede d'atleta); onicomicosi, micosi del tronco e delle pieghe cutanee, pityriasis versicolor. Polvere cutanea: e' indicata per la terapia delle micosi umide della pelle e delle pieghe cutanee soprattutto se localizzate in zone abitualmente coperte scarsamente aerate (ad esempio: dermatiti da fasciatura, micosi interdigitale) nonche' come coadiuvante del trattamento con la crema, gele soluzione cutanea. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati. **POSOLOGIA** Crema, gel e soluzione cutanea: salvo diversa prescrizione medica il prodotto va applicato in piccola quantita' sulle parti infette con un lieve massaggio una volta sola al giorno, preferibilmente la sera primadi coricarsi. Il farmaco crema e gel sono elettivamente indicati per il trattamento delle zone cutanee scoperte. Il medicinale gel, grazie al potere rinfrescante dei suoi componenti risulta particolarmente utile nei casi in cui alla infezione in atto sia associata una componente infiammatoria con sensazione di bruciore e/o di prurito cutaneo. Data l'elevata attivita' del prodotto e' di norma sufficiente l'applicazione di una piccola quantita' (ad es. mezzo cm di crema o gel) per coprire una superficie della grandezza di un palmo di mano. Il farmaco soluzione cutanea e' utile soprattutto per il trattamento delle zone cutanee coperte da peli nonche' delle infezioni fungine in corrispondenza delle pieghe cutanee, con eccezione delle mucose. Il farmaco crema, gele soluzione cutanea e' inodore, non macchia e puo' essere facilmente asportato con acqua. Ai fini di una completa guarigione e' indispensabile l'impiego controllato e sufficientemente prolungato del prodotto. Si consiglia di non interrompere la terapia subito dopo la scomparsa delle manifestazioni flogistiche acute e della sintomatologia soggettiva, ma di attenersi ai seguenti tempi medi di trattamento, a seconda del tipo di infezione, della estensione e della localizzazione dell'infezione stessa: tinea pedis 3 settimane; tinea corporis, tinea manuum, tinea cruris 2-(3) settimane; pityriasis versicolor 2 settimane;

candidosi cutanee superficiali 2-(4) settimane. I tempi di trattamento indicati tra parentesi vanno riferiti a forme, a giudizio medico, particolarmente estese o resistenti. Polvere cutanea: le parti di cute interessate si possono cospargere con la polvere, una o più volte al giorno, in rapporto al grado di umidità ed alla localizzazione delle micosi. La polvere cutanea può, su parere medico, essere applicata come coadiuvante della crema, del gel o della soluzione cutanea (ad esempio: al mattino polvere, alla sera crema, gel o soluzione cutanea). La polvere cutanea può essere cosparsa, in caso di tinea pedis, in scarpe e calze anche al fine di eliminare le condizioni di umidità e di evitare reinfezioni.

**CONSERVAZIONE** Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

**AVVERTENZE** L'impiego, specie se prolungato, di medicinali per uso cutaneo, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso, è necessario interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea. Ugualmente ci si comporterà in caso di sviluppo di microorganismi resistenti.

**Popolazione pediatrica:** nella primissima infanzia il medicinale deve essere usato solo in caso di effettiva necessità. Il farmaco crema contiene alcol cetilstearylco che può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).

**INTERAZIONI** Non sono segnalate in letteratura interazioni del bifonazolo con altri medicinali o altre forme di interazione.

**EFFETTI INDESIDERATI** Il medicinale crema, gel, soluzione e polvere è perfettamente tollerato. Solamente in rari casi possono insorgere un leggero e per lo più transitorio arrossamento della pelle e più raramente un senso di bruciore ed irritazione che di norma scompaiono rapidamente. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale.

**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Nelle donne in stato di gravidanza il medicinale deve essere usato solo in caso di effettiva necessità.