

AZOLMEN*soluz cutanea 30 ml 1%

Marchio: AZOLMEN
Codice Min.: 026048114
Link: [clicca qui per acquistare](#)



D E N O M I N A Z I O N E A Z O L M E N C A T E G O R I A
FARMACOTERAPEUTICA Antimicotici per uso topico. **PRINCIPI**
ATTIVI Bifonazolo. **ECCIPIENTI** Crema: sorbitano monostearato; polisorbato 60;
 spermaceti; alcool cetilstearylco; ottildodecanolo; alcool benzilico; acqua
 depurata. Gel: miscela di alcoli grassi etossilati; gliceridi di acidi grassi etossilati;
 isopropilisostearato; alcool etilico; acido lattico; alcool benzilico; acqua depurata.
 Soluzione cutanea: etanolo; isopropilmiristato. **Polvere cutanea** amido di riso non
 gelificabile. **INDICAZIONI** Crema, gel e soluzione cutanea: dermatomicosi
 sostenute da dermatofiti (ad es. tricofiti), da saccaromiceti (ad es. Candida) e da
 altri funghi patogeni (ad es. Malassezia furfur). Dermatosi da sovrainfezioni
 sostenute dai suddetti funghi patogeni e da germi sensibili al farmaco. Nell'ambito

di queste affezioni sono comprese micosi plantare e interdigitale della mano e del piede (piede d'atleta);
 onicomicosi, micosi del tronco e delle pieghe cutanee, pityriasis versicolor. **Polvere cutanea:** e' indicata
 per la terapia delle micosi umide della pelle e delle pieghe cutanee soprattutto se localizzate in zone
 abitualmente coperte o scarsamente aerate (ad esempio: dermatiti da fasciatura, micosi interdigitale)
 nonche' come coadiuvante del trattamento con la crema, gele soluzione
 cutanea. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi
 degli eccipienti elencati. **POSODOLOGIA** Crema, gel e soluzione cutanea: salvo diversa prescrizione medica
 il prodotto va applicato in piccola quantita' sulle parti infette con un lieve massaggio una volta sola al
 giorno, preferibilmente la sera prima di coricarsi. Il farmaco crema e gel sono elettivamente indicati per il
 trattamento delle zone cutanee scoperte. Il medicinale gel, grazie al potere rinfrescante dei suoi
 componenti risulta particolarmente utile nei casi in cui alla infezione in atto sia associata una
 componente infiammatoria con sensazione di bruciore e/o di prurito cutaneo. Data l'elevata attivita' del
 prodotto e' di norma sufficiente l'applicazione di una piccola quantita' (ad es. mezzo cm di crema o gel)
 per coprire una superficie della grandezza di un palmo di mano. Il farmaco soluzione cutanea e' utile
 soprattutto per il trattamento delle zone cutanee coperte da peli nonche' delle infezioni fungine in
 corrispondenza delle pieghe cutanee, con eccezione delle mucose. Il farmaco crema, gele soluzione
 cutanea e' inodore, non macchia e puo' essere facilmente asportato con acqua. Ai fini di una completa
 guarigione e' indispensabile l'impiego controllato e sufficientemente prolungato del prodotto. Si consiglia
 di non interrompere la terapia subito dopo la scomparsa delle manifestazioni flogistiche acute e della
 sintomatologia soggettiva, ma di attenersi ai seguenti tempi medi di trattamento, a seconda del tipo di
 infezione, della estensione e della localizzazione dell'infezione stessa: tinea pedis 3 settimane; tinea
 corporis, tinea manuum, tinea cruris 2-(3) settimane; pityriasis versicolor 2 settimane; candidosi cutanee
 superficiali 2-(4) settimane. I tempi di trattamento indicati tra parentesi vanno riferiti a forme, a giudizio

medico, particolarmente estese o resistenti. Polvere cutanea: le parti di cute interessate si possono cospargere con la polvere, una o piu' volte al giorno, in rapporto al grado di umidita' ed alla localizzazione delle micosi. La polvere cutanea puo', su parere medico, essere applicato come coadiuvante della crema, del gel o della soluzione cutanea (ad esempio: al mattino polvere, alla sera crema, gel o soluzione cutanea). La polvere cutanea puo' essere cosparsa, in caso di tinea pedis, in scarpe e calze anche al fine di eliminare le condizioni di umidita' e di evitare reinfezioni.

CONSERVAZIONE Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

AVVERTENZE L'impiego, specie se prolungato, di medicinali per uso cutaneo, puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso, e' necessario interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea. Ugualmente ci si comportera' in caso di sviluppo di microorganismi resistenti.

Popolazione pediatrica: nella primissima infanzia il medicinale deve essere usato solo in caso di effettiva necessita'. Il farmaco crema contiene alcol cetilstearylco che puo' causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).

INTERAZIONI Non sono segnalate in letteratura interazioni del bifonazolo con altri medicinali o altre forme di interazione.

EFFETTI INDESIDERATI Il medicinale crema, gel, soluzione e polvere e' perfettamente tollerato. Solamente in rari casi possono insorgere un leggero e per lo piu' transitorio arrossamento della pelle e piu' raramente un senso di bruciore ed irritazione che di norma scompaiono rapidamente. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Nelle donne in stato di gravidanza il medicinale deve essere usato solo in caso di effettiva necessita'.