

BENAGOL GUSTO LIMONE SENZA ZUCCHERO - 16 PASTIGLIE

Marchio: Reckitt Benckiser
Codice Min.: 016242214
Link: [clicca qui per acquistare](#)



BENAGOL GUSTO LIMONE SENZA ZUCCHERO - 16 PASTIGLIE

Questo prodotto è un farmaco senza obbligo di ricetta (OTC - SOP), Farmajet ti informa che è importante leggere sempre il foglietto illustrativo e le avvertenze prima dell'utilizzo.

DENOMINAZIONE:
BENAGOL

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA:

Antisettici.

PRINCIPI ATTIVI:

>>Pastiglie gusto Ginger e Spezie, Pastiglie gusto Miele e Limone, Pastiglie gusto Limone Senza Zucchero, Pastiglie gusto Fragola Senza Zucchero e Pastiglie gusto Menta Fredda: 2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg; amilmetacresolo 0,6 mg.

>>Pastiglie gusto Mentolo-Eucaliptolo: 2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg; amilmetacresolo 0,6 mg; mentolo 8,0 mg.

>>Pastiglie con Vitamina C gusto Arancia: 2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg; amilmetacresolo 0,6 mg; sodio ascorbato 74,9 mg; acido ascorbico 33,5 mg.

ECCIPIENTI:

>>Pastiglie gusto Ginger e Spezie: saccarosio, glucosio liquido, acido tartarico, antocianine (E163), aroma prugna, aroma crema, aroma spezie e, aroma ginger, trigliceridi a media catena.

>>Pastiglie gusto Miele e Limone: essenza di menta, essenza di limone, acido tartarico, miele, glucosio liquido, saccarosio.

>>Pastiglie gusto Mentolo-Eucaliptolo: indaco carminio (E 132), essenza di eucaliptolo, acido tartarico, saccarosio liquido, glucosio liquido.

>>Pastiglie con Vitamina C gusto Arancia: saccarosio, glucosio liquido, acido tartarico, aroma di arancia, mentolo, glicole propilenico.

>>Pastiglie gusto Limone Senza Zucchero : aroma di limone, saccarinato sodico, acido tartarico, sciroppo di maltitolo, isomaltosio.

>>Pastiglie gusto Fragola Senza Zucchero: aroma di fragola, Ponceau 4R (E124), saccarinato sodico,

acido tartarico, sciroppo di maltitolo, isomaltosio.

>>Pastiglie gusto Menta Fredda: xilitolo, mentolo, aroma menta, olio di eucalipto, saccarosio liquido, glucosio liquido.

INDICAZIONI:

Antisettico del cavo orale.

CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDARI:

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Non somministrare ai bambini di età inferiore ai 2 anni.

Non somministrare le pastiglie gusto Menta Fredda e gusto Ginger e Spezie a bambini di età inferiore ai 12 anni.

POSOLOGIA:

Lasciar sciogliere lentamente in bocca una pastiglia ogni 2 o 3 ore.

Per le pastiglie con Vitamina C gusto Arancia e gusto Menta Fredda, non superare il massimo giornaliero di 8 pastiglie.

Somministrare le pastiglie gusto Menta Fredda e gusto Ginger e Spezie ad adulti e ragazzi di età superiore ai 12 anni.

Le pastiglie gusto Limone Senza Zucchero e gusto Fragola Senza Zucchero sono adatti per quei pazienti che devono controllare l'apporto di zuccheri e calorico.

Fare attenzione ai bambini piccoli in quanto se le pastiglie vengono deglutite intere possono provocare soffocamento.

CONSERVAZIONE:

Non conservare a temperatura superiore ai 25 gradi C.

AVVERTENZE:

In caso di comparsa di fenomeni di sensibilizzazione o irritativi occorre interrompere la somministrazione.

Non somministrare il prodotto ai bambini di età inferiore ai 2 anni.

>>Eccipienti.

Il medicinale, eccetto le pastiglie gusto Limone Senza Zucchero e gusto Fragola Senza Zucchero, contiene saccarosio (di cui si tenga conto in caso di diabete o di diete ipocaloriche) e glucosio; quindi non sono adatte per pazienti con sindrome da malassorbimento di glucosio/galattosio e per i pazienti con intolleranza ereditaria al fruttosio e deficit di saccarasiisomaltasi.

Le pastiglie gusto Fragola Senza Zucchero contengono il colorante Ponceau 4R (E124) che può provocare reazioni di tipo allergico.

Le pastiglie gusto Ginger e Spezie contengono eccipienti in grado di indurre una sensazione di calore nella bocca e nella gola durante l'assunzione della pastiglia.

INTERAZIONI:

Non sono note interazioni con altri farmaci.

EFFETTI INDESIDERATI:

Raramente possono verificarsi disordini gastrointestinali, fenomeni di ipersensibilita', irritazione della lingua.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO:

Nelle donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento il prodotto va somministrato solo in caso di effettiva necessita'.