

## BENAGOL\*16 pastiglie menta fredda

**Marchio:** BENAGOL  
**Codice Min.:** 016242164  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE**BENAGOL **PASTIGLIE****CATEGORIA**  
**FARMACOTERAPEUTICA**Antisettico.**PRINCIPI ATTIVI**Questo  
farmaco gusto ginger e spezie: 2,4-diclorobenzil alcool 1,2  
mg;amimetacresolo 0,6 mg. Questo farmaco gusto miele e  
limone: 2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg; amimetacresolo 0,6 mg.  
Questo farmaco gustolimone senza zucchero: 2,4-diclorobenzil  
alcool 1,2 mg; amimetacresolo 0,6 mg. Questo farmaco gusto  
fragola senza zucchero: 2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg;  
amimetacresolo 0,6 mg. Questo farmaco gusto menta fredda:  
2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg; amimetacresolo 0,6 mg.  
Questo farmaco gusto mentolo-eucaliptolo: 2,4-diclorobenzil

alcool 1,2 mg; amimetacresolo 0,6 mg; mentolo 8,0 mg. Questo farmaco con Vitamina C gusto arancia:  
2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg; amimetacresolo 0,6 mg;sodio ascorbato 74,9 mg; acido ascorbico 33,5  
mg.**ECCIPIENTI**Questo medicinale gusto ginger e spezie: una pastiglia contiene saccarosio, glucosio  
liquido, acido tartarico, antocianine (E163), aroma prugna, aroma crema, aroma spezie, aroma ginger,  
trigliceridi a media catena. Questo medicinale gusto miele e limone: una pastiglia contiene essenza di  
menta, essenza di limone, acido tartarico, miele, glucosio liquido, saccarosio. Questo farmaco gusto  
mentolo-eucaliptolo: una pastiglia contiene indaco carminio (E 132), essenza di eucaliptolo, acido  
tartarico, saccarosio liquido, glucosio liquido. Questo medicinale conVitamina C gusto arancia: una  
pastiglia contiene saccarosio, glucosioliquido, acido tartarico, aroma di arancia, mentolo, glicole  
propilenico. Questo medicinale gusto limone senza zucchero: una pastiglia contiene aroma di limone,  
saccarinato sodico, acido tartarico, sciroppo dimaltitolo, isomaltosio. Questo medicinale gusto fragola  
senza zucchero: una pastiglia contiene aroma di fragola, antocianine (E163), saccarinato sodico, acido  
tartarico, sciroppo di maltitolo, isomaltosio. Questo medicinale gusto menta fredda: una pastiglia  
contiene xilitolo, mentolo, aroma menta, olio di eucalipto, saccarosio liquido, glucosio  
liquido.**INDICAZIONI**Antisettico del cavo orale.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita'  
ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non somministrare ai bambini di eta' inferiore ai 6  
anni. Questo farmaco gusto mentolo-eucaliptolo e' controindicato nei bambini con unastoria di epilessia  
o convulsioni febbrili. Non somministrare questo medicinale gusto menta fredda e questo medicinale  
gusto ginger e speziea bambini di eta' inferiore ai 12 anni.**POSOLOGIA**Posologia: deve essere utilizzata  
la dose piu' bassa efficace per la durata piu' breve necessaria ad alleviare i sintomi. Adulti e bambini  
sopra i 6 anni d'eta': una pastiglia ogni 2 o 3 ore. Nei bambini al disopra dei 6 anni di eta' consultare il  
proprio medico per una appropriata posologia. Non superare le dosi consigliate ed in particolare,  
perquesto farmaco con Vitamina C gusto arancia e questo farmaco gusto menta fredda, non superare il

massimo giornaliero di 8 pastiglie. Per tutti gli altri gusti di questo medicinale, non superare la massima dose giornaliera di 12 pastiglie. Somministrare questo farmaco gusto mentafredda e questo farmaco gusto ginger e spezie ad adulti e ragazzi di età superiore ai 12 anni. La durata del trattamento con questo medicinale gusto mentolo-eucaliptolo non deve superare i 3 giorni. Questo medicinale gusto limone senza zucchero e questo medicinale gusto fragola senza zucchero sono adatti per quei pazienti che devono controllare l'apporto di zuccheri e calorico. Popolazione anziana: non sono disponibili dati. Modo di somministrazione: somministrazione oromucosale. La pastiglia va disciolta lentamente in bocca.

**CONSERVAZIONE** Non conservare a temperatura superiore ai 25 gradi C.

**AVVERTENZE** Fare attenzione ai bambini in età prescolare in quanto se le pastiglie vengono deglutite intere possono provocare soffocamento. In caso di comparsa di fenomeni di sensibilizzazione o irritativi occorre interrompere la somministrazione ed istituire idoneo trattamento. Questo farmaco gusto mentolo-eucaliptolo contiene derivati terpenici che, in dosi eccessive, possono provocare disturbi neurologici come convulsioni in neonati e bambini. Il trattamento con questo medicinale gusto mentolo-eucaliptolo non deve essere prolungato per più di 3 giorni per i rischi associati all'accumulo di derivati terpenici, quali ad esempio canfora, cineolo, niaouli, timo selvatico, terpineolo, terpineolo, citrale, mentolo e oli essenziali di aghi di pino, eucalipto e trementina (a causa delle loro proprietà lipofile non è nota la velocità di metabolismo e smaltimento) nei tessuti e nel cervello, in particolare disturbi neuropsicologici. Non deve essere utilizzata una dose superiore a quella raccomandata per evitare un maggior rischio di reazioni avverse al medicinale e i disturbi associati al sovradosaggio. Questo farmaco gusto mentolo-eucaliptolo è infiammabile, non deve essere avvicinato a fiamme. Informazioni importanti su alcuni eccipienti: questo medicinale gusto ginger e spezie, questo medicinale gusto miele e limone, questo medicinale gusto menta fredda, questo medicinale gusto mentolo-eucaliptolo e questo medicinale con Vitamina C gusto arancia contengono glucosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale. Questo farmaco gusto ginger e spezie, questo farmaco gusto miele e limone, questo farmaco gusto menta fredda, questo farmaco gusto mentolo-eucaliptolo e questo farmaco con Vitamina C gusto arancia contengono saccarosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di glucosio-galattosio, o da insufficienza di sucralasi isomaltasi, non devono assumere questo medicinale. Questo medicinale gusto limone senza zucchero e questo medicinale gusto fragola senza zucchero contengono maltitolo. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, non devono assumere questo medicinale. Questo farmaco gusto ginger e spezie contiene eccipienti in grado di indurre una sensazione di calore nella bocca e nella gola durante la suzione della pastiglia.

**INTERAZIONI** Non sono note interazioni con altri farmaci. Questo farmaco gusto mentolo-eucaliptolo non deve essere usato in concomitanza con altri prodotti (medicinali o cosmetici) contenenti derivati terpenici, indipendentemente dalla via di somministrazione (orale, rettale, cutanea, nasale o inalatoria).

**EFFETTI INDESIDERATI** Questo farmaco gusto mentolo - eucaliptolo: a causa della presenza di mentolo e in caso di non osservanza delle dosi raccomandate può presentarsi un rischio di convulsioni nei bambini e nei neonati. Le reazioni avverse associate all'uso di 2,4 diclorobenzil alcol, amilmetacresolo, levomentolo e acido ascorbico vengono elencate di seguito, divise per frequenza e classe d'organo. Le frequenze sono definite come: Molto comune ( $\geq 1/10$ ); Comune ( $\geq 1/100$  e  $= 1/1000$  e  $= 1/10000$  e

**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Nelle donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento il prodotto va somministrato solo in caso di effettiva necessità. Gravidanza: non vi sono, o sono disponibili in numero limitato, i dati relativi all'uso dei principi attivi di questo farmaco in donne in

gravidanza. Questo medicinale gusto mentolo-eucaliptolo non e' raccomandato durante la gravidanza e in donne in eta' fertile che non usano misure contraccettive. Allattamento: non e' noto se i principi attivi o i loro metaboliti sono escreti nel latte materno. Il rischio per i neonati e i lattanti non puo' essere escluso. L'acido ascorbico o i suoi metaboliti sono escreti nel latte materno. Fertilita': non e' disponibile nessun dato relativo all'effetto sulla fertilita'. Questo farmaco gusto mentolo-eucaliptolo non e' raccomandato in donne in eta' fertile che non usano misure contraccettive.