

BENAGOL*16 pastiglie miele limone 0,6 mg + 1,2 mg

Marchio: BENAGOL
Codice Min.: 016242240
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONEBENAGOL PASTIGLIE**CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICAAntisettico.**PRINCIPI ATTIVI**Questo
farmaco gusto ginger e spezie: 2,4-diclorobenzil alcool 1,2
mg;amimetacresolo 0,6 mg. Questo farmaco gusto miele e
limone: 2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg; amimetacresolo 0,6 mg.
Questo farmaco gustolimone senza zucchero: 2,4-diclorobenzil
alcool 1,2 mg; amimetacresolo 0,6 mg. Questo farmaco gusto
fragola senza zucchero: 2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg;
amimetacresolo 0,6 mg. Questo farmaco gusto menta fredda:
2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg; amimetacresolo 0,6 mg.
Questo farmaco gusto mentolo-eucaliptolo: 2,4-diclorobenzil

alcool 1,2 mg; amimetacresolo 0,6 mg; mentolo 8,0 mg. Questo farmaco con Vitamina C gusto arancia:
2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg; amimetacresolo 0,6 mg;sodio ascorbato 74,9 mg; acido ascorbico 33,5
mg.**ECCIPIENTI**Questo medicinale gusto ginger e spezie: una pastiglia contiene saccarosio, glucosio
liquido, acido tartarico, antocianine (E163), aroma prugna, aroma crema, aroma spezie, aroma ginger,
trigliceridi a media catena. Questo medicinale gusto miele e limone: una pastiglia contiene essenza di
menta, essenza di limone, acido tartarico, miele, glucosio liquido, saccarosio. Questo farmaco gusto
mentolo-eucaliptolo: una pastiglia contiene indaco carminio (E 132), essenza di eucaliptolo, acido
tartarico, saccarosio liquido, glucosio liquido. Questo medicinale conVitamina C gusto arancia: una
pastiglia contiene saccarosio, glucosioliquido, acido tartarico, aroma di arancia, mentolo, glicole
propilenico. Questo medicinale gusto limone senza zucchero: una pastiglia contiene aroma di limone,
saccarinato sodico, acido tartarico, sciroppo dimaltitolo, isomaltosio. Questo medicinale gusto fragola
senza zucchero: una pastiglia contiene aroma di fragola, antocianine (E163), saccarinato sodico, acido
tartarico, sciroppo di maltitolo, isomaltosio. Questo medicinale gusto menta fredda: una pastiglia
contiene xilitolo, mentolo, aroma menta, olio di eucalipto, saccarosio liquido, glucosio
liquido.**INDICAZIONI**Antisettico del cavo orale.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita'
ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non somministrare ai bambini di eta' inferiore ai 6
anni. Questo farmaco gusto mentolo-eucaliptolo e' controindicato nei bambini con unastoria di epilessia
o convulsioni febbrili. Non somministrare questo medicinale gusto menta fredda e questo medicinale
gusto ginger e speziea bambini di eta' inferiore ai 12 anni.**POSOLOGIA**Posologia: deve essere utilizzata
la dose piu' bassa efficace per la durata piu' breve necessaria ad alleviare i sintomi. Adulti e bambini
sopra i 6 anni d'eta': una pastiglia ogni 2 o 3 ore. Nei bambini al disopra dei 6 anni di eta' consultare il
proprio medico per una appropriata posologia. Non superare le dosi consigliate ed in particolare,
perquesto farmaco con Vitamina C gusto arancia e questo farmaco gusto menta fredda, non superare il

massimo giornaliero di 8 pastiglie. Per tutti gli altri gusti di questo medicinale, non superare la massima dose giornaliera di 12 pastiglie. Somministrare questo farmaco gusto mentafredda e questo farmaco gusto ginger e spezie ad adulti e ragazzi di età superiore ai 12 anni. La durata del trattamento con questo medicinale gusto mentolo-eucaliptolo non deve superare i 3 giorni. Questo medicinale gusto limone senza zucchero e questo medicinale gusto fragola senza zucchero sono adatti per quei pazienti che devono controllare l'apporto di zuccheri e calorico. Popolazione anziana: non sono disponibili dati. Modo di somministrazione: somministrazione oromucosale. La pastiglia va disciolta lentamente in bocca.

CONSERVAZIONE Non conservare a temperatura superiore ai 25 gradi C.

AVVERTENZE Fare attenzione ai bambini in età prescolare in quanto se le pastiglie vengono deglutite intere possono provocare soffocamento. In caso di comparsa di fenomeni di sensibilizzazione o irritativi occorre interrompere la somministrazione ed istituire idoneo trattamento. Questo farmaco gusto mentolo-eucaliptolo contiene derivati terpenici che, in dosi eccessive, possono provocare disturbi neurologici come convulsioni in neonati e bambini. Il trattamento con questo medicinale gusto mentolo-eucaliptolo non deve essere prolungato per più di 3 giorni per i rischi associati all'accumulo di derivati terpenici, quali ad esempio canfora, cineolo, niaouli, timo selvatico, terpineolo, terpineolo, citrale, mentolo e oli essenziali di aghi di pino, eucalipto e trementina (a causa delle loro proprietà lipofile non è nota la velocità di metabolismo e smaltimento) nei tessuti e nel cervello, in particolare disturbi neuropsicologici. Non deve essere utilizzata una dose superiore a quella raccomandata per evitare un maggior rischio di reazioni avverse al medicinale e i disturbi associati al sovradosaggio. Questo farmaco gusto mentolo-eucaliptolo è infiammabile, non deve essere avvicinato a fiamme. Informazioni importanti su alcuni eccipienti: questo medicinale gusto ginger e spezie, questo medicinale gusto miele e limone, questo medicinale gusto menta fredda, questo medicinale gusto mentolo-eucaliptolo e questo medicinale con Vitamina C gusto arancia contengono glucosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale. Questo farmaco gusto ginger e spezie, questo farmaco gusto miele e limone, questo farmaco gusto menta fredda, questo farmaco gusto mentolo-eucaliptolo e questo farmaco con Vitamina C gusto arancia contengono saccarosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di glucosio-galattosio, o da insufficienza di sucralasi isomaltasi, non devono assumere questo medicinale. Questo medicinale gusto limone senza zucchero e questo medicinale gusto fragola senza zucchero contengono maltitolo. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, non devono assumere questo medicinale. Questo farmaco gusto ginger e spezie contiene eccipienti in grado di indurre una sensazione di calore nella bocca e nella gola durante la suzione della pastiglia.

INTERAZIONI Non sono note interazioni con altri farmaci. Questo farmaco gusto mentolo-eucaliptolo non deve essere usato in concomitanza con altri prodotti (medicinali o cosmetici) contenenti derivati terpenici, indipendentemente dalla via di somministrazione (orale, rettale, cutanea, nasale o inalatoria).

EFFETTI INDESIDERATI Questo farmaco gusto mentolo - eucaliptolo: a causa della presenza di mentolo e in caso di non osservanza delle dosi raccomandate può presentarsi un rischio di convulsioni nei bambini e nei neonati. Le reazioni avverse associate all'uso di 2,4 diclorobenzil alcol, amilmetacresolo, levomentolo e acido ascorbico vengono elencate di seguito, divise per frequenza e classe d'organo. Le frequenze sono definite come: Molto comune ($\geq 1/10$); Comune ($\geq 1/100$ e $= 1/1000$ e $= 1/10000$ e

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Nelle donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento il prodotto va somministrato solo in caso di effettiva necessità. Gravidanza: non vi sono, o sono disponibili in numero limitato, i dati relativi all'uso dei principi attivi di questo farmaco in donne in

gravidanza. Questo medicinale gusto mentolo-eucaliptolo non e' raccomandato durante la gravidanza e in donne in eta' fertile che non usano misure contraccettive. Allattamento: non e' noto se i principi attivi o i loro metaboliti sono escreti nel latte materno. Il rischio per i neonati e i lattanti non puo' essere escluso. L'acido ascorbico o i suoi metaboliti sono escreti nel latte materno. Fertilita': non e' disponibile nessun dato relativo all'effetto sulla fertilita'. Questo farmaco gusto mentolo-eucaliptolo non e' raccomandato in donne in eta' fertile che non usano misure contraccettive.