

BIOFLORIN*25 cps 75 mld

Marchio: BIOFLORIN
Codice Min.: 024274019
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONEBIOFLORIN CAPSULE RIGIDE**CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICAMicroorganismi antidiarroici.**PRINCIPI**
ATTIVOOgni capsula rigida contiene: principio attivo:
enterococchi del tipo L.A.B. (>) ceppo SF68 liofilizzati, non meno
di 75 milioni. Eccipiente(i) con effetti noti: una capsula contiene
257,7 g di lattosio. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere
paragrafo 6.1.**ECCIPIENTI**Lattosio, magnesio stearato, silice
precipitata.**INDICAZIONI**Bioflorin risulta di notevole utilità per la
correzione dei quadri da alterazione della microflora intestinale
dovuti a varie cause di ordine dietetico-nutrizionale, tossico,
ambientale, climatico, ecc. Bioflorin è indicato in tutte le

condizioni cliniche in cui assume un ruolo determinante un'alterazione della microflora intestinale. In particolare esso può rappresentare il trattamento sin dall'esordio di: enteriti e diarree infettive in genere come: enterocolite dell'adulto; enteriti, enterocoliti, dispepsie tossiche del bambino. Dismicrobismi intestinali di differente origine, come quelli da antibiotici o da altri farmaci e da squilibri dietetico-nutrizionali e quadri clinici dipendenti.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Non sono sinora note controindicazioni al trattamento.**POSOLOGIA**La posologia media è di 3 capsule al giorno nell'adulto e di 1-2 capsule al giorno nei bambini; in questi ultimi l'assunzione può essere facilitata disperdendo il contenuto della capsula in liquidi (acqua, latte, tè, ecc.). A giudizio del medico, in rapporto alla gravità della forma clinica, le dosi indicate potranno essere anche raddoppiate senza alcun rischio di intolleranze. La durata media del trattamento è di 5-7 giorni.**CONSERVAZIONE**Conservare a temperatura inferiore a 25 gradi C.**AVVERTENZE**Evitare l'assunzione concomitante con gli antibiotici cui l'enterococco ceppo SF68 è sensibile. Le capsule contengono: lattosio: i pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi, o da malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale.**INTERAZIONI**Il principio attivo di BIOFLORIN è sensibile all'azione di taluni antibiotici, specie le tetracicline e, in molto minor misura, all'ampicillina, al cloramfenicolo e alla cefaloridina.**EFFETTI INDESIDERATI**Non sono stati sinora segnalati effetti secondari conseguenti al trattamento. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Il preparato può essere impiegato senza inconvenienti sia in corso di gravidanza che

di allattamento.