

BRENSTAR 7 FLACONCINI 10 ML

Marchio: Stardea
Codice Min.: 905080610
Link: [clicca qui per acquistare](#)



BRENStar F L A C O N C I N I Estratti titolati di Ginkgo biloba (335 mg), Vitis Vinifera, Camellia sinensis, con Acetil-L-carnitina, Fosfatidilserina, Acido folico e Magnesio con fruttosio, lattosio ed edulcoranti **INTEGRATORE ALIMENTARE** Il Ginkgo biloba è utile per coadiuvare le funzioni cognitive e la memoria, oltre che per favorire la funzionalità del microcircolo.** La Camellia sinensis è un tonico utile per la stanchezza mentale e fisica.** Il Magnesio e l'Acido Folico contribuiscono alla normale funzione psicologica e alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.* *Claims autorizzati dall'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza alimentare) e approvati dal Ministero della salute in applicazione del regolamento 1924/2006 della Commissione Europea e

successivo Regolamento 432/2012 **Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici (allegato 1 del Decreto 9 luglio 2012 del Ministero della Salute "Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali", aggiornato dal Decreto 27 marzo 2014) **Ingredienti** **Contenuto del tappo dosatore:** Edulcorante: DMannitolo, Lattosio, Ginkgo biloba estratto secco titolato al 24% in ginkgo flavoni glicosidi (Ginkgo biloba L. foglie, Maltodestrina), Fosfatidilserina titolata al 40% (contiene lecitina di Soia), Vite rossa estratto secco titolato al 95% in Procianidine (Vitis vinifera L. semi). **Antiagglomerante:** Silice micronizzata. **Agente di carica:** Carbosimetilcellulosa, Acido folico. **Contenuto del flacone:** Acqua, Fruttosio, Miele d'acacia, Magnesio cloruro esaidrato, Ginkgo biloba estratto fluido idroalcolico D/E 1:1 (Ginkgo biloba L. foglie), Acetil-L-carnitina cloridrato. **Correttore di Acidità:** Sodio lattato, Tè verde estratto secco titolato al 40% in polifenoli totali (Camellia sinensis (L.) Kuntze foglie), Aroma naturale di arancio. **Conservante:** Potassio sorbato. **Edulcorante:** Acesulfame K. **Modalità d'uso** Si consiglia l'assunzione di 1 flacone al mattino diluito in acqua o altra bevanda. **Avvertenze** Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Per donne in gravidanza e in allattamento e bambini, si raccomanda di consultare il medico. **Formato** 7 flaconi monodose da 10 ml cad. con tappo dosatore.