

BRUNICROM*collirio 20 monod 0,3 ml 2%

Marchio: Bruschetti
Codice Min.: 034927018
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONEBRUNICROM 2% COLLIRIO, SOLUZIONE CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Decongestionanti ed anti allergici. **PRINCIPI ATTIVI** Sodio cromoglicato. **ECCIPIENTI** Sodio cloruro (isotonizzante), acqua depurata. **INDICAZIONI** Trattamento preventivo di forme allergiche oculari quali congiuntivite allergica e cheratoconjuntivite primaverile. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati. **POSOLOGIA** Instillare una o due gocce del collirio nel

sacco congiuntivale inferiore di ogni occhio 4 volte al giorno. Quando possibile, il trattamento va iniziato prima dell'esposizione allo stimolo allergico e continuato con regolarita' durante tutto il periodo di esposizione o comunque fino alla remissione della sintomatologia. Modo di somministrazione: ogni contenitore contiene una quantita' di collirio sufficiente per un solo trattamento di entrambi gli occhi. Aprire la bustina. Staccare con cautela un contenitore monodose. Richiudere accuratamente la bustina contenente i rimanenti contenitori monodose ripiegando i lembi del lato aperto. Aprire il contenitore monodose facendo ruotare la parte superiore piatta. Instillare la soluzione negli occhi e gettare il contenitore dopo l'uso. **CONSERVAZIONE** Non conservare a temperatura superiore a +25 gradi C; conservare nell'imballaggio esterno; proteggere dalla luce diretta del sole. **AVVERTENZE** Evitare di toccare l'occhio con il beccuccio del contenitore. Il collirio e' presentato in contenitori monodose sterili e non contiene conservanti; pertanto puo' essere usato anche da pazienti portatori di lenti a contatto. Ogni microflacone deve essere eliminato dopo l'uso. **INTERAZIONI** Non sono note interazioni con altri medicinali. Nel caso di trattamento concomitante con altro collirio, lasciare 15 minuti d'intervallo tra le instillazioni dei due diversi farmaci. **EFFETTI INDESIDERATI** L'instillazione del collirio puo' talvolta provocare localmente bruciore e/o prurito transitori. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** La somministrazione durante il primo trimestre di gravidanza deve essere limitata ai casi di effettiva necessita'. Gli studi condotti sugli animali hanno evidenziato che il sodio cromoglicato difficilmente si ritrova nel latte materno. Non sono riportati dalla letteratura scientifica effetti indesiderati sui bambini allattati al seno.