

CANFORA (MARCO VITI)*soluz ial 100 g 10%

Marchio: MARCO VITI
Codice Min.: 030325017
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE CANFORA MARCO VITI 10% SOLUZIONE CUTANEA **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari. **PRINCIPI ATTIVI** 100 g di soluzione contengono 10 g di canfora. Soluzione oleosa. Eccipienti con effetti noti: olio di arachidi e butilidrossianisolo (BHA). Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **ECCIPIENTI** Soluzione idroalcolica: etanolo, acqua depurata. Soluzione oleosa: olio di arachidi, BHA. **INDICAZIONI** Come rubefacente e analgesico, e' indicata nel trattamento di nevralgie leggere, dolori articolari e muscolari, gotta, irritazioni e pruriti cutanei. Come antisettico, e' indicata nel trattamento di ulcere torpide, erisipela e gangrena nosocomiale. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio

attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1; cute lesa; bambini fino a 30 mesi di eta'; bambini con una storia di epilessia e convulsioni febbrili. **POSOLOGIA** La soluzione si applica localmente con leggero massaggio, frizionando per 3-5 minuti la zona interessata. Si raccomanda di non superare la dose massima giornaliera di 0,6 g (corrispondenti a 6 g). Il medicinale non deve essere ingerito. **Popolazione pediatrica** Canfora Marco Viti e' controindicato nei bambini fino a 30 mesi di eta' (vedere paragrafo 4.3). La durata del trattamento non deve superare i 3 giorni. **CONSERVAZIONE** Conservare il contenitore nella confezione originale ben chiuso per proteggere il medicinale dalla luce. **AVVERTENZE** Non usare soluzioni a base di canfora concentrate, contenenti piu' dell'11% di canfora, perche' possono essere irritanti e pericolose. Non ingerire la soluzione di canfora, in quanto puo' causare effetti indesiderati gravi, compreso il decesso. **Popolazione pediatrica:** Canfora soluzione cutanea non deve essere applicata sulle narici dei bambini anche in piccola quantita' perche' potrebbe causare shock. Canfora Marco Viti contiene derivati terpenici che, in dosi eccessive, possono provocare disturbi neurologici come convulsioni in neonati e bambini. Il trattamento non deve essere prolungato per piu' di 3 giorni per i rischi associati all'accumulo di derivati terpenici, quali ad esempio canfora, cineolo, niaouli, timo selvatico, terpineolo, terpinina, citrale, mentolo e oli essenziali di aghi di pino, eucalipto e trementina (a causa delle loro proprieta' lipofiliche non e' nota la velocita' di metabolismo e di smaltimento) nei tessuti e nel cervello, in particolare disturbi neuropsicologici. Non deve essere utilizzata una dose superiore a quella raccomandata per evitare un maggior rischio di reazioni avverse al medicinale e i disturbi associati al dosaggio (vedere paragrafo 4.9). Canfora Marco Viti e' infiammabile, non deve essere avvicinata a fiamme. **Informazioni importanti su alcuni eccipienti** Canfora Marco Viti 10% soluzione cutanea oleosa contiene: olio di arachidi: in caso di allergia alle arachidi o alla soia, non utilizzare il medicinale, BHA: puo' causare reazioni cutanee locali (es. dermatite da contatto) o irritazione degli occhi o delle mucose. **INTERAZIONI** Canfora Marco Viti non deve essere

usato in concomitanza con altri prodotti (medicinali o cosmetici) contenenti derivati terpenici, indipendentemente dalla via di somministrazione (orale, rettale, cutanea, nasale o inalatoria).

EFFETTI INDESIDERATI Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di canfora, organizzati secondo la classificazione per sistemi ed organi MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. Patologie del sistema nervoso: delirio, depressione del Sistema Nervoso Centrale, coma, convulsioni epilettiche, cefalea, vertigini, shock (raro). Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche: asma, insufficienza respiratoria, shock (raro). Patologie gastrointestinali: pirosi, dolore epigastrico, vomito, nausea. Patologie renali e urinarie: anuria. Disturbi del sistema immunitario: asma, orticaria, eritema. Popolazione pediatrica: a causa della presenza di canfora in caso di non osservanza delle dosi raccomandate può presentarsi un rischio di convulsioni nei bambini e nei neonati. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Gravidanza: non vi sono o sono disponibili in numero limitato i dati relativi all'uso di canfora in donne in gravidanza. Canfora Marco Vitinon è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive. Allattamento: vi sono informazioni insufficienti sull'escrezione di canfora nel latte materno. Canfora Marco Viti non deve essere usato durante l'allattamento.