

CANFORA (NEW.FA.DEM.)*soluz ial 100 ml 10%

Marchio: NEW.FA.DEM. SRL
Codice Min.: 031060015
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONECANFORA NEW.FA.DEM. 10% SOLUZIONE CUTANEA**CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari.**PRINCIPI ATTIVI**Canfora 10 g.**ECCIPIENTI**Soluzione idroalcolica: acqua depurata, etanolo 96%. Soluzione oleosa:olio vegetale di soia.**INDICAZIONI**Come rubefacente e analgesico, e' indicata nel trattamento di nevralgie leggere, dolori articolari e muscolari, gotta, irritazioni e pruriticutanei. Come antisettico, e' indicata nel trattamento di ulcere torpide, erisipela e gangrena nosocomiale.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti; cute lesa, ferite, abrasioni; bambini di eta' inferiore ai 2 anni per il rischio di laringospasmo e convulsioni.**POSOLOGIA**La soluzione si applica localmente con leggero massaggio, frizionandoper 3-5 minuti la zona interessata Si raccomanda di non superare la dose massima giornaliera di 0,60 g (corrispondenti a 6 ml). Il medicinale non deve essere ingerito.**CONSERVAZIONE**Nessuna in particolare. Conservare a temperatura non superiore ai 30 gradi C. Conservare il contenitore nella confezione originale ben chiuso per proteggere il medicinale da luce e calore.**AVVERTENZE**Non usare soluzioni a base di canfora concentrate, contenenti piu' dell'11% di canfora, perche' possono essere irritanti e pericolose. Non ingerire la soluzione di canfora, in quanto puo' causare effetti indesiderati gravi, compreso il decesso. Canfora soluzione cutanea non deve essere applicata sulle narici dei bambini anche in piccola quantita' perche' potrebbe causare shock. La soluzione alcolica contiene alcool,per chi svolge attivita' sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico puo' determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.**INTERAZIONI**Non sono stati effettuati studi di interazione.**EFFETTI INDESIDERATI**Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di canfora, organizzati secondo la classificazione sistemica organica MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. Patologie del sistema nervoso: delirio, depressione del Sistema Nervoso Centrale, coma, convulsioni epilettiche, cefalea, vertigini, shock (raro). Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche: asma, insufficienza respiratoria, shock (raro). Patologie gastrointestinali: piroisi, dolore epigastrico, vomito, nausea. Patologie renali e urinarie: anuria. Disturbi del sistema immunitario: asma, orticaria,eritema.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Non sono disponibili dati clinici relativi a gravidanze esposte. Gli studi su animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale. E' necessario usare cautela quando il medicinale viene prescritto a donne in gravidanza in quanto la canfora attraversa la placenta. Non sono disponibili dati sull'utilizzo del medicinale durante l'allattamento;pertanto occorre usare con cautela in caso di allattamento.