

CANFORA (SELLA)*soluz cutanea oleosa 100 g 10%

Marchio: SELLA
Codice Min.: 029785033
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONECANFORA SELLA 10% SOLUZIONE CUTANEA**CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICAFarmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari.**PRINCIPI ATTIVI**100
g di soluzione contengono: canfora 10 g.**ECCIPIENTI**Soluzione idroalcolica: alcool etilico, acqua
depurata. Soluzione oleosa: olio di arachidi.**INDICAZIONI**Come rubefacente e analgesico, e' indicata nel
trattamento di nevralgie leggere, dolori articolari e muscolari, gotta, irritazioni e pruriticutanei. Come
antisettico, e' indicata nel trattamento di ulcere torpide, erisipela e gangrena
nosocomiale.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno
qualsiasi degli eccipienti; cute lesa, ferite, abrasioni; bambini fino a 30 mesi di eta'; bambini con una
storia di epilessia o convulsioni febbrili.**POSOLOGIA**La soluzione cutanea e' controindicata nei bambini
fino a 30 mesi di eta'. La soluzione si applica localmente con leggero massaggio, frizionando per 3-5
minuti la zona interessata. Si raccomanda di non superare la dose massima giornaliera di 0,60 g
(corrispondenti a 6 ml). La durata del trattamento non deve superare i 3 giorni. Il medicinale non deve
essere ingerito.**CONSERVAZIONE**Conservare il contenitore nella confezione originale ben chiuso per
proteggere il medicinale da luce e calore.**AVVERTENZE**Questo prodotto contiene derivati terpenici che,
in dosi eccessive, possono provocare disturbi neurologici come convulsioni in neonati e bambini. Il
trattamento non deve essere prolungato per piu' di 3 giorni per i rischi associati all'accumulo di derivati
terpenici, quali ad esempio canfora, cineolo, niaouli, timo selvatico, terpineolo, terpina, citrale, mentolo e
oli essenziali di aghi di pino, eucalipto e trementina (a causa delle loro proprieta' lipofiliche non e' nota la
velocita' di metabolismo e smaltimento) nei tessuti e nel cervello, in particolare disturbi neuropsicologici.
Non deve essere utilizzata una dose superiore a quella raccomandata per evitare un maggior rischio di
reazioni avverse al medicinale e i disturbi associati al sovradosaggio. Il prodotto e' infiammabile, non
deve essere avvicinato a fiamme. Non usare soluzioni a base di canfora concentrate, contenenti piu'
dell'11% di canfora, perche' possono essere irritanti e pericolose. Non ingerire la soluzione di canfora, in
quanto puo' causare effetti indesiderati gravi, compreso il decesso. Canfora soluzione cutanea non deve
essere applicata sulle narici dei bambini anche in piccola quantita' perche' potrebbe causare shock.
Informazioni importanti su alcuni eccipienti: la soluzione cutanea oleosa contiene olio di arachidi. In caso
di allergia alle arachidi o soia, non assumere il medicinale.**INTERAZIONI**La soluzione cutanea non deve
essere usata in concomitanza con altri prodotti (medicinali o cosmetici) contenenti derivati terpenici,
indipendentemente dalla via di somministrazione (orale, rettale, cutanea, nasale o inalatoria). Non sono
stati effettuati studi di interazione.**EFFETTI INDESIDERATI**A causa della presenza di canfora e in caso
di non osservanza delle dosi raccomandate puo' presentarsi un rischio di convulsioni nei bambini e nei
neonati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di canfora, organizzati secondo la classificazione
sistemica organica MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli
effetti elencati. **Patologie del sistema nervoso:** delirio, depressione del Sistema Nervoso Centrale, coma,

convulsioni epilettiche, cefalea, vertigini, shock (raro). Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche: asma, insufficienza respiratoria, shock (raro). Patologie gastrointestinali: pirosi, dolore epigastrico, vomito, nausea. Patologie renali e urinarie: anuria. Disturbi del sistema immunitario: asma, orticaria, eritema. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non vi sono o sono disponibili in numero limitato i dati relativi all'uso di canfora in donne in gravidanza. Canfora Sella 10% soluzione cutanea non è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive. Vi sono informazioni insufficienti sull'escrezione di canfora nel latte materno. Il medicinale non deve essere utilizzato durante l'allattamento.