

CANFORA (ZETA FARMACEUTICI)*soluz ial 100 ml 10%

Marchio: ZETA FARMACEUTICI
Codice Min.: 031309014
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONECANFORA ZETA 10% SOLUZIONE CUTANEA**CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICA Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari.**PRINCIPI**
ATTIVICanfora 10 g.**ECCIPIENTI**Soluzione idroalcolica: etanolo, acqua depurata. Soluzione oleosa: olio
di arachidi, BHA, BHT, glicole esilenico, acido citrico monoidrato, gliceril oleato, ascorbil
palmitato.**INDICAZIONI**Come rubefacente e analgesico, e' indicata nel trattamento di nevralgie leggere,
dolori articolari e muscolari, gotta, irritazioni e pruriticutanei. Come antisettico, e' indicata nel trattamento
di ulcere torpide, erisipela e gangrena
nosocomiale.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno
qualsiasi degli eccipienti. Il farmaco soluzione cutanea oleosa contiene olio di arachidi: non utilizzare in
caso di ipersensibilita'; cute lesa; bambini fino a 30 mesi di eta'; bambini con una storia di epilessia o
convulsioni febbrili.**POSOLOGIA**La soluzione si applica localmente con leggero massaggio,
frizionando per 3-5 minuti la zona interessata. Si raccomanda di non superare la dose massima
giornaliera di 0,60 g (corrispondenti a 6 g). Il medicinale non deve essere ingerito. Il farmaco e'
controindicato nei bambini fino a 30 mesi di eta'. La durata del trattamento non deve superare i
3 giorni.**CONSERVAZIONE**Conservare il contenitore nella confezione originale ben chiuso per
proteggere il medicinale dalla luce.**AVVERTENZE**Non usare soluzioni a base di canfora concentrate,
contenenti piu' dell'11% di canfora, perche' possono essere irritanti e pericolose. Non ingerire la
soluzione di canfora, in quanto puo' causare effetti indesiderati gravi, compreso il decesso. Canfora
soluzione cutanea non deve essere applicata sulle narici dei bambini anche in piccola quantita' perche'
potrebbe causare shock. Il medicinale contiene derivati terpenici che, in dosi eccessive, possono
provocare disturbi neurologici come convulsioni in neonati e bambini. Il trattamento non deve essere
prolungato per piu' di 3 giorni per i rischi associati all'accumulo di derivati terpenici, quali ad esempio
canfora, cineolo, niaouli, timo selvatico, terpineolo, terpina, citrale, mentolo e oli essenziali di aghi di pino,
eucalipto e trementina (a causa delle loro proprieta' lipofile non e' nota la velocita' di metabolismo e di
smaltimento) nei tessuti e nel cervello, in particolare disturbi neuropsicologici. Non deve essere utilizzata
una dose superiore a quella raccomandata per evitare un maggior rischio di reazioni avverse al
medicinale e i disturbi associati al sovradosaggio. La canfora e' infiammabile, non deve essere avvicinato
a fiamme. Il medicinale soluzione cutanea oleosa contiene olio di arachidi e BHA e BHT.**INTERAZIONI**Il
medicinale non deve essere usato in concomitanza con altri prodotti (medicinali o cosmetici) contenenti
derivati terpenici, indipendentemente dalla via di somministrazione (orale, rettale, cutanea, nasale
o inalatoria).**EFFETTI INDESIDERATI**A causa della presenza di canfora e in caso di non osservanza
delle dosi raccomandate puo' presentarsi un rischio di convulsioni nei bambini e nei neonati. Di seguito
sono riportati gli effetti indesiderati di canfora, organizzati secondo la classificazione sistemica organica
MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Patologie del sistema nervoso: delirio, depressione del Sistema Nervoso Centrale, coma, convulsioni epilettiche, cefalea, vertigini, shock (raro). Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche: asma, insufficienza respiratoria, shock (raro). Patologie gastrointestinali: pirosi, dolore epigastrico, vomito, nausea. Patologie renali e urinarie: anuria. Disturbi del sistema immunitario: asma, orticaria, eritema. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non vi sono o sono disponibili in numero limitato i dati relativi all'uso di canfora in donne in gravidanza. Il farmaco non è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive. Vi sono informazioni insufficienti sull'escrezione di canfora nel latte materno. Il medicinale non deve essere utilizzato durante l'allattamento.