

CANFORA*soluz ol 100 ml 10%

Marchio: ALMUS SRL
Codice Min.: 031312022
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONECANFORA ALMUS 10% SOLUZIONE CUTANEA**CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICAFarmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari.**PRINCIPI**
ATTIVICanfora 10 g.**ECCIPIENTI**Soluzione idroalcolica: alcool 96 per cento, acqua depurata.
Soluzione oleosa: olio di arachidi raffinato, gliceril monooleato, idrossianisolo butilato, glicole esilenico,
idrossitoluene butilato, acido citricomonoidrato, ascorbil palmitato.**INDICAZIONI**Come rubefacente e
analgesico, e' indicata nel trattamento di nevralgie leggere, dolori articolari e muscolari, gotta, irritazioni
e pruriticutanei. Come antisettico, e' indicata nel trattamento di ulcere torpide, erisipela e gangrena
nosocomiale.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno
qualsiasi degli eccipienti; cute lesa, ferite, abrasioni; bambini fino a 30 mesi di eta'; bambini con una
storia di epilessia o convulsioni febbrili.**POSOLOGIA**La soluzione si applica localmente con leggero
massaggio, frizionandoper 3-5 minuti la zona interessata. Si raccomanda di non superare la dose
massima giornaliera di 0,60 g (corrispondenti a 6 ml). Il medicinale non deve essere ingerito. Il
medicinale e' controindicato nei bambini fino a 30 mesi di eta'. La durata del trattamento non deve
superare i 3 giorni.**CONSERVAZIONE**Conservare il contenitore nella confezione originale ben chiuso per
proteggere il medicinale dalla luce.**AVVERTENZE**Questo prodotto contiene derivati terpenici che, in dosi
eccessive, possono provocare disturbi neurologici come convulsioni in neonati e bambini. Il trattamento
non deve essere prolungato per piu' di 3 giorni per i rischi associati all'accumulo di derivati terpenici
quali ad esempio canfora, cineolo, niaouli, timo selvatico, terpineolo, terpinina, citrale, mentolo e oli
essenziali di aghi di pino, eucalipto e trementina (a causa delle loro proprieta' lipofile non e' nota la
velocita'di metabolismo e smaltimento) nei tessuti e nel cervello, in particolare disturbi neuropsicologici.
Non deve essere utilizzata una dose superiore a quella raccomandata per evitare un maggior rischio di
reazioni avverse al medicinale e i disturbi associati al sovradosaggio. Il prodotto e' infiammabile, non
deve essere avvicinato a fiamme. Non usare soluzioni a base di canfora concentrate, contenenti piu'
dell'11% di canfora, perche' possono essere irritanti e pericolose. Non ingerire la soluzione di canfora, in
quanto puo' causare effetti indesiderati gravi, compreso il decesso. Canfora soluzione cutanea non deve
essere applicata sulle narici dei bambini anche in piccola quantita' perche' potrebbe causare shock.
Canfora soluzione cutanea, 1 flacone 100 ml soluzione oleosa contiene olio di arachidi raffinato;
idrossianisolo butilato e idrossitoluene butilato.**INTERAZIONI**Il medicinale non deve essere usato in
concomitanza con altri prodotti(medicinali o cosmetici) contenenti derivati terpenici, indipendentemente
dalla via di somministrazione (orale, rettale, cutanea, nasale o inalatoria).**EFFETTI INDESIDERATI**Di
seguito sono riportati gli effetti indesiderati di canfora, organizzati secondo la classificazione sistemica
organica MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti
elencati. Patologie del sistema nervoso: delirio, depressione del Sistema Nervoso Centrale, coma,
convulsioni epilettiche, cefalea, vertigini, shock (raro). Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche:

asma, insufficienza respiratoria, shock (raro). Patologie gastrointestinali: pirosi, dolore epigastrico, vomito, nausea. Patologie renali urinarie: anuria. Disturbi del sistema immunitario: asma, orticaria, eritema. A causa della presenza di canfora e in caso di non osservanza delle dosi raccomandate può presentarsi un rischio di convulsioni nei bambini e nei neonati. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non vi sono o sono disponibili in numero limitato i dati relativi all'uso di canfora in donne in gravidanza. Il medicinale non è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive. Gli studi su animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale. È necessario usare cautela quando il medicinale viene prescritto a donne in gravidanza in quanto la canfora attraversa la placenta. Vi sono informazioni insufficienti sull'escrezione di canfora nel latte materno. Il medicinale non deve essere utilizzato durante l'allattamento.