

CELLUVISC*30 monod collirio 0,4 ml 5 mg/ml

Marchio: CELLUVISC
Codice Min.: 034447045
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE CELLUVISC 5 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Lacrime artificiali ed altri preparati indifferenti. PRINCIPI ATTIVI CELLUVISC 5 mg/ml 1 ml contiene 5 mg di carmellosa sodica; 1 goccia (=0,05 ml) contiene 0,25 mg di carmellosa sodica. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. ECCIPIENTI Sodio cloruro, calcio cloruro diidrato, potassio cloruro, sodio lattato, magnesio cloruro esaidrato, acqua purificata. INDICAZIONI Trattamento sintomatico delle irritazioni o secchezze oculari lievi dovute ad alterazioni della stabilita' del

f i l m
lacrimale. CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI persensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. POSOLOGIA Instillare 1-2 gocce del prodotto direttamente nel sacco congiuntivale. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di CELLUVISC 5 mg/ml collirio, soluzione nei pazienti pediatrici non e' stata ancora stabilita. Pazienti anziani: non sono state osservate differenze significative correlate all'eta', pertanto non e' necessario modificare la dose nei pazienti anziani. CONSERVAZIONE Non conservare a temperatura superiore ai 25 gradi C. AVVERTENZE Solo per uso esterno. L'uso, specie prolungato, dei medicinali per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione (ad esempio, irritazioni, dolore, arrossamenti, modifiche della vista). In tal caso o se la condizione peggiora, interrompere il trattamento e consultare il medico. Poiche' CELLUVISC 5 mg/ml collirio, soluzione e' una preparazione sterile, al fine di evitare la contaminazione o una possibile lesione dell'occhio, la punta del flaconcino monodose non deve toccare ne' l'occhio ne' venire a contatto con altra superficie. Il medicinale, una volta aperto, non deve essere riutilizzato. INTERAZIONI Non sono state osservate interazioni con altri medicinali. CELLUVISC 5mg/ml collirio, soluzione puo' prolungare il tempo di contatto di medicinali topici comunemente usati in oftalmologia. In caso di trattamento concomitante con altre medicazioni oculari, si devono aspettare 5 minuti prima d'instillare CELLUVISC 5 mg/ml collirio, soluzione. EFFETTI INDESIDERATI Le reazioni avverse osservate con CELLUVISC 5 mg/ml collirio, soluzione documentate dagli studi clinici, sono classificate per sistemi e organi ed elencate di seguito come: molto comune ($\geq 1/10$); comune ($\geq 1/100$, $= 1/1000$, $= 1/10000$), GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non sono stati condotti specifici studi clinici sull'uso di CELLUVISC 5 mg/ml collirio, soluzione in gravidanza e allattamento. Tuttavia, studi non clinici non hanno evidenziato effetti dannosi in gravidanza. A causa dello scarso assorbimento sistemico e' improbabile che CELLUVISC 5 mg/ml collirio, soluzione venga escreto nel latte materno.