


CLIN 4000 LASSATIVO POLVERE 200 G

Marchio: -
Codice Min.: 931774107
Link: [clicca qui per acquistare](#)



CLIN 4000 Dispositivo medico classe IIa. Lassativo in polvere per soluzione orale a base di Macrogol 4000. È particolarmente indicato nella stitichezza cronica; è ugualmente indicato nel caso di intestino occasionalmente irregolare. Grazie alla sua affinità per l'acqua, ammorbidisce le feci facilitando l'evacuazione. In questo modo favorisce un senso di benessere e sollievo. Non provoca né crampi, né dolore addominale, né condizioni di urgenza. La sua efficacia non si riduce nel tempo. Non contiene eccipienti né aromatizzanti. Senza zucchero. Modalità d'uso Sciogliere la polvere mescolando in una qualsiasi bevanda. 10 g di polvere va disciolto in almeno 125 ml (aumentare a 150 ml in età pediatrica) di qualsiasi bevanda anche calda, come tè, tisane, latte, brodo

o succo di frutta. Il prodotto non altera il gusto della bevanda. Bere la soluzione così ricostituita. Si consiglia di assumere lontano dai pasti. Per le sue caratteristiche di sicurezza, consente un'ampia flessibilità di dosaggio. Adulti e bambini di peso superiore ai 20 kg: 10 g, 1-3 volte al giorno, secondo la risposta individuale. Per ottenere un effetto più rapido, la dose massima giornaliera (30 g) può essere assunta in un'unica somministrazione. In caso di uso prolungato, la dose può essere ridotta a 10 g 1-2 volte al giorno, anche a giorni alterni, preferibilmente la sera. Bambini fino a 20 kg: il dosaggio va commisurato al peso corporeo. Si consiglia pertanto l'uso della confezione in flacone da 200 g di polvere con cucchiaio dosatore che consente di personalizzare la dose in funzione delle reali esigenze del bambino fino ad ottenere feci morbide. Non superare il dosaggio massimo giornaliero di 30 g. Avvertenze Non assumere in caso di: ipersensibilità nota a macrogol; perforazione e/o ostruzione gastrointestinale. In gravidanza ed allattamento il prodotto va usato dietro prescrizione medica. Non sono note interazioni con farmaci ma è opportuno che l'assunzione del prodotto sia distanziata di almeno 2 ore da quella di farmaci orali. Occasionalmente si possono notare distensione addominale e/o nausea che si risolvono continuando l'uso. Casi rari di reazioni allergiche (rash, orticaria): in questo caso sospendere l'uso del prodotto ed informare il proprio medico o farmacista. In caso di sovradosaggio, può manifestarsi diarrea che si risolve, spontaneamente, con la sospensione del prodotto. Conservazione Conservare nella confezione originale in luogo fresco ed asciutto Formato Flacone da 200 g con cucchiaio dosatore. Clin 4000 è disponibile anche nella confezione da 30 bustine monouso. Ogni bustina contiene 10 g di Macrogol 4000.