

COLLIRO ALFA ANTISTAMINICO*collirio 10 ml 8 mg/ml + 1 mg/ml

Marchio: COLLIRIO ALFA
Codice Min.: 027837018
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE COLLIRIO ALFA ANTISTAMINICO 0,8 MG/ML + 1 MG/ML
C O L L I R I O , S O L U Z I O N E C A T E G O R I A
FARMACOTERAPEUTICA Decongestionanti ed antiallergici. PRINCIPALI ATTIVI
1 ml di soluzione contiene: nafazolina nitrato 0,8 mg, tonzilamina cloridrato 1
mg. ECCIPIENTI Collirio, flacone da 10 ml: sodio cloruro, sodio citrato, sodio
citrato monobasico, sodio edetato, benzalconio cloruro, levomentolo,
alcooletilico, acqua per preparazioni iniettabili. Collirio, contenitore monodose:
sodio cloruro, sodio citrato, sodio citrato monobasico, sodio edetato, levomentolo,
alcol etilico, acqua per preparazioni iniettabili. INDICAZIONI Stati allergici ed
infiammatori della congiuntiva, accompagnati da fotofobia, lacrimazione,
sensazione di corpi estranei. CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI Non deve

essere usato da soggetti con glaucoma ad angolo chiuso o con altre gravi malattie dell'occhio.
Ipersensibilità verso i componenti verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista
chimico. Non deve essere usato nei bambini al di sotto dei dodici anni. Contemporaneo trattamento con
farmaci inibitori delle monoaminossidasi. POSOLOGIA Instillare nell'occhio interessato 1-2 gocce, fino a
2-3 volte al giorno, secondo necessità. Attenersi scrupolosamente alle dosi consigliate. Un dosaggio
superiore del prodotto anche se assunto per via topica e per breve periodo di tempo può dar luogo ad
effetti sistemici gravi. In caso di persistere o aggravarsi dei sintomi dopo breve periodo di trattamento
consultare il medico. In ogni caso, il prodotto non deve essere impiegato per più di 4 giorni consecutivi,
salvo diversa prescrizione medica, in quanto si possono verificare effetti
indesiderati. CONSERVAZIONE Collirio, flacone 10 ml: conservare nella confezione originale. Validità
dopo prima apertura: 30 giorni. Collirio, contenitore monodose: conservare ad una temperatura non
superiore ai 30 gradi C, nella confezione originale. Il contenitore monodose non contiene conservanti;
per questo motivo ogni contenitore monodose, una volta aperto, deve essere gettato dopo l'uso, anche
se utilizzato solo in parte. AVVERTENZE Il prodotto, pur presentando uno scarsissimo assorbimento
sistemico, deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da ipertensione, ipertiroidismo, disturbi
cardiaci, asma bronchiale e iperglicemia (diabete). Infezioni, pus, corpi estranei nell'occhio, danni
meccanici, chimici, da calore, richiedono l'intervento del medico. L'ingestione accidentale può causare
depressione del SNC (sedazione spiccata o ipotonia). Poiché il prodotto, nella confezione flacone 10
ml, contiene il benzalconio cloruro, durante il trattamento, non devono essere indossate lenti a contatto
morbide. Poiché il benzalconio cloruro non è presente nella confezione monodose, questa può essere
utilizzata dai portatori di lenti a contatto, o da coloro che manifestano ipersensibilità al benzalconio
cloruro. INTERAZIONI Non deve essere usato se state assumendo farmaci inibitori della
monoaminossidasi o se sono passate meno di due settimane dall'ultima somministrazione di questi

medicinali poiché possono insorgere gravi crisi ipertensive. EFFETTI INDESIDERATI L'uso del prodotto può determinare talvolta dilatazione pupillare, effetti sistemici da assorbimento (ipertensione, disturbi cardiaci, iperglicemia), aumento della pressione endoculare, nausea, cefalea. Raramente possono manifestarsi fenomeni di ipersensibilità. In tal caso occorre interrompere il trattamento e consultare il medico affinché, ove necessario, possa essere istituita terapia idonea. Il paziente è invitato a segnalare al medico curante o al farmacista l'eventuale comparsa di effetti indesiderati non descritti. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO In gravidanza e durante l'allattamento usare solo in caso di effettiva necessità, sotto il diretto controllo del medico.