

CORTIDRO*crema derm 20 g 0,5%

Marchio: CORTIDRO
Codice Min.: 010318032
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONECORTIDRO 0,5% CREMA**CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICACorticosteroidi, preparati
dermatologici.**PRINCIPI ATTIVI**100 g di crema contengono 0,5 g
di idrocortisone acetato.**ECCIPIENTI**Alcool cetostearilico, sodio
laurilsolfato, olio di vaselina, vaselinafilante, metile P-
idrossibenzoato, propile P-idrossibenzoato, acqua
distillata.**INDICAZIONI**Il prodotto trova impiego in caso di
punture d'insetti, pruriti, eritemi o ustioni circoscritte,
eczemi.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita'
al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. L'uso
dell'idrocortisone e' controindicato nel caso di affezioni virali,

batteriche o fungine.**POSOLOGIA**Per adulti e bambini di eta' superiore ai due anni: applicare sulla parte
una minima quantita' di crema e frizionare leggermente allo scopo di facilitarne la penetrazione.
L'applicazione puo' essere ripetuta due o tre volte al di' per pochi giorni. In caso di mancata risposta alla
terapia e' opportuno rivolgersi al medico. Non superare la dose consigliata.**CONSERVAZIONE**Non
conservare a temperatura superiore ai 30 gradi C.**AVVERTENZE**La crema non trova impiego
oftalmologico ne' va applicata nelle zone periorbitali. Evitare l'impiego nel trattamento del prurito vulvare
se associato a perdite vaginali. Evitare le applicazioni prolungate, in particolare su ampie superfici.
L'uso, specie se prolungato, dei prodotti di uso topico puo' dare origine a fenomeni di irritazione o
sensibilizzazione. In tal caso e' necessario interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di
istituire una terapia idonea. Disturbi visivi. Con l'uso di corticosteroidi sistemici e topici possono essere
riferiti disturbi visivi. Se un paziente si presenta con sintomi come visione offuscata o altri disturbi visivi,
e' necessario considerare il rinvio a un oculista per la valutazione delle possibili cause che possono
includere cataratta, glaucoma o malattie rare come la corioretinopatia sierosa centrale (CSCR), che
sono state segnalate dopo l'uso di corticosteroidi sistemici e topici. Popolazione pediatrica. Nei bambini
al di sotto dei due anni, il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessita' sotto il diretto
controllo del medico.**INTERAZIONI**E' necessario osservare cautela nell'associazione dei
corticosteroidi con amfotericina B perche' possono sommare le loro azioni ipokalemizzanti. I
corticosteroidi antagonizzano gli effetti degli anticoagulanti, pertanto si sconsiglia l'uso contemporaneo
con gli stessi specialmente se derivati cumarinici. I barbiturici accelerano il metabolismo
dei corticosteroidi per l'induzione enzimatica e riducono il loro effetto, si sconsiglia, pertanto, la loro
associazione.**EFFETTI INDESIDERATI**Gli effetti indesiderati sistemici dei preparati corticosteroidi
per uso topico sono estremamente improbabili per i bassi dosaggi impiegati: in caso di insorgenza,
interrompere la terapia. Patologie dell'occhio, non comune ($\geq 1/1.000$), **GRAVIDANZA E**

ALLATTAMENTO Il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessit  e sotto il diretto controllo del medico.