

## CRYSTACIDE\*crema derm 25 g 1%

**Marchio:** GIULIANI  
**Codice Min.:** 034220032  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE**CRYSTACIDE CREMA ALL'1%**CATEGORIA**  
**FARMACOTERAPEUTICA**Antisettici e disinfettanti.**PRINCIPI**  
**ATTIVI**Perossido di idrogeno all'1.0% (p/p).**ECCIPIENTI**Gliceril  
monolaurato; gliceril monomiristato; macrogol stearato  
5000;propilene glicol; acido citrico anidro; idrossido di sodio;  
acido solforico, 1M; ossalato di sodio; acido salicilico; edetato  
disodico; pirofosfato di sodio; stannato di sodio; acqua  
purificata.**INDICAZIONI**La crema di medicinale e' formulata per  
l'applicazione topica nel trattamento di infezioni cutanee  
superficiali primitive e secondarie causate da organismi sensibili  
a l p e r o s s i d o d i

idrogeno.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**persensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi  
degli eccipienti.**POSOLOGIA**Adulti, anziani e bambini: la crema si applica 2-3 volte al giorno sulla parte  
infetta della pelle. Il periodo di trattamento non deve protrarsi per piu' di 3 settimane. Sulla ferita puo'  
apparire una pellicola asciutta che puo' essere tolta lavando la parte con  
acqua.**CONSERVAZIONE**Conservare a temperatura inferiore a 25 gradi C, in un luogo  
asciutto.**AVVERTENZE**Evitare il contatto con gli occhi. Il farmaco non deve essere usato su vaste o  
profonde ferite, oppure sulla cute sana. Il perossido d'idrogeno puo' sbiancare i tessuti. L'acido salicilico  
e' un lieve irritante e puo' causare dermatiti. Il medicinale contiene inoltre propilene glicol che puo'  
causare irritazione cutanea.**INTERAZIONI**Il farmaco e' incompatibile con lo iodio, i permanganati e altri  
agenti ossidanti piu' forti.**EFFETTI INDESIDERATI**Una lieve sensazione di bruciore puo' essere avvertita  
per breve tempo dopo l'applicazione. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano  
dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del  
rapporto beneficio/rischio del medicinale.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Da usare sotto controllo  
medico.