

CTARD*60 cps 500 mg rilascio prolungato flacone

Marchio: CTARD
Codice Min.: 021115023
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE C-TARD 500 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Acido ascorbico (vit.C) comprese le associazioni. **PRINCIPI ATTIVI** Ogni capsula contiene: acido ascorbico mg 500 in microperline a cessione prolungata. **ECCIPIENTI** Eccipienti delle microperle: saccarosio, gomma lacca, talco, amido, acido tartarico. Eccipienti delle capsule gelatinose: gelatina, titanio biossido, ossido di ferro giallo, eritrosina, giallo chinolina. **INDICAZIONI** Profilassi e terapia della carenza di Vitamina C (gravidanza, allattamento, alimentazione artificiale dei lattanti, tendenza alle emorragie per fragilità capillare). Coadiuvante nella terapia delle stomatiti e delle gengiviti. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilità verso il farmaco. **POSOLOGIA** Una capsula di C-TARD al mattino ed una capsula alla sera.

Non superare le dosi consigliate. **CONSERVAZIONE** Conservare a temperatura non superiore a 25 gradi C. **AVVERTENZE** L'acido ascorbico può interferire, ad alte dosi, sui risultati di alcuni test diagnostici (in particolare la ricerca di glucosio nelle urine con mezzi non specifici). Il prodotto contiene saccarosio, di ciò si tenga conto in pazienti diabetici e in pazienti che seguono un regime ipocalorico. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il Medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. **INTERAZIONI** Non sono mai stati evidenziati problemi connessi alla interazione con altri farmaci. **EFFETTI INDESIDERATI** Ai dosaggi più alti di quelli consigliati, sono stati riferiti cefalea e disturbi gastrointestinali. Qualora si verificassero eventuali altri effetti indesiderati, consultare il Medico. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Non esistono controindicazioni.