

DAFLON*60 cpr riv 500 mg

Marchio: DAFLON
Codice Min.: 023356049
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE DAFLON 500 MG COMPRESSE RIVESTITE
C O N F I L M C A T E G O R I A
F A R M A C O T E R A P E U T I C A Vasoprotettore e
venotonico.
PRINCIPI ATTIVI Ogni compressa rivestita con film
contiene 500 mg di frazione flavonoica purificata micronizzata
costituita da 450 mg di diosmina e 50 mg diflavonoidi espressi in
esperidina.
ECCIPIENTI Carbossimetilamido sodico, cellulosa
microcristallina, gelatina, glicerina, ipromellosa, sodio
laurilsolfato, ossido di ferro giallo E172, ossido di ferro rosso E
172, titanio diossido, macrogol 6000, magnesio stearato,
talco.
INDICAZIONI Sintomi attribuibili a insufficienza venosa; stati

di fragilita' capillare.
CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARIipersensibilita' al principio attivo o ad uno
qualsiasi degli eccipienti.
POSOLOGIA 2 compresse rivestite con film al giorno (1 a mezzogiorno e 1 alla
sera) al momento dei pasti, anche nell'insufficienza venosa del plesso
emorroidario.
CONSERVAZIONE Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare per la
conservazione.
AVVERTENZE Nessuna.
INTERAZIONI Non sono stati effettuati studi di interazione.
Finora non e' stata segnalata alcuna interazione farmacologica clinicamente rilevante dall'esperienza
post marketing sul prodotto.
EFFETTI INDESIDERATI Il seguente effetti o reazioni avverse sono stati
riportati e sono stati classificati secondo la seguente frequenza: molto comune ($\geq 1/10$); comune
($\geq 1/100$, $= 1/1.000$, $= 1/10.000$,
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Gravidanza. I dati relativi all'uso di
frazione flavonoica purificata micronizzata in donne in gravidanza non esistono o sono in numero
limitato. Gli studi sugli animali non indicano tossicita' riproduttiva. Ascopo precauzionale, e' preferibile
evitare l'uso di Daflon durante la gravidanza. Allattamento. Non e' noto se il principio attivo/metaboliti
siano escreti nel latte materno. Il rischio per i neonati/lattanti non puo' essere escluso. Deve essere
presa la decisione se interrompere l'allattamento con latte materno o interrompere la
terapia/astenersi dalla terapia con Daflon tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento con
latte materno per il bambino e il beneficio della terapia per la donna. Fertilita'. Studi di tossicita'
riproduttiva non hanno mostrato effetti sulla fertilita' nei ratti ne' maschi ne' femmine.