

## DAFNEGIN\*6 ovuli vag 100 mg

**Marchio:** DAFNEGIN  
**Codice Min.:** 025217112  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**DENOMINAZIONE** DAFNEGIN **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Antimicrobici ed antisettici ginecologici. **PRINCIPI ATTIVI** Un ovulo vaginale da 100 mg contiene: ciclopiroxolamina 0,100 g. 100 g di crema vaginale contengono: ciclopiroxolamina 1 g. **ECCIPIENTI** Un ovulo vaginale da 100 mg contiene: acido benzoico, glicerilemonoricinoleato, gliceridi semisintetici. 100 g di crema vaginale contengono: 2-ottildodecanolo, paraffina liquida, vaselina filante, alcool cetilico, alcool stearilico, alcool miristilico, dietanolamide di acidi grassi di cocco, polisorbato 60, sorbitan monostearato, alcool benzilico, acido lattico, acqua deionizzata. **INDICAZIONI** Ovuli vaginali: affezioni vulvo-vaginali prodotte da Candida. Crema vaginale: affezioni vulvo-vaginali e peri-anali prodotte da Candida. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Ipersensibilita' individuale accertata verso il farmaco. **POSOLOGIA** Ovuli vaginali: 1 ovulo da 100 mg per 3-6 giorni in funzione della gravita' dell'infezione e a giudizio del medico. Crema vaginale: avvitare l'applicatore sul tubo di crema e riempirlo praticando una leggera pressione sul tubo. Introdurre l'applicatore in profondita' nella vagina e applicare il contenuto (5 g) quotidianamente prima di coricarsi per 6 giorni consecutivi o, a giudizio del medico, fino a un massimo di 14 giorni. Per l'applicazione si raccomanda una posizione sulla schiena con le gambe leggermente piegate. Per impedire una reinfezione e' opportuno trattare con un po' di crema vaginale anche la cute peri-vaginale e peri-ale. **CONSERVAZIONE** Nessuna particolare precauzione: normali condizioni di conservazione a temperatura ambiente. **AVVERTENZE** E' possibile un'infezione reciproca; per prevenire una reinfezione, e' consigliabile la contemporanea terapia del partner. Nelle applicazioni topiche o intravaginali non si ha praticamente assorbimento sistemico del preparato. L'uso, specie se prolungato, di farmaci per uso topico puo' dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tale evenienza occorre sospendere il trattamento ed adottare idonee misure terapeutiche. **INTERAZIONI** Non sono note. **EFFETTI INDESIDERATI** Raramente prurito, bruciore o irritazione locale. Dafnegin, crema vaginale, contiene tra gli eccipienti alcool cetilico e alcool stearilico come componenti di base. Di cio' occorre tener conto nel caso di ipersensibilita' nota nei confronti di queste sostanze. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** In gravidanza il farmaco va somministrato nei casi di effettiva necessita' e sotto il diretto controllo del medico.