

DERMOCORTAL*crema derm 20 g 0,5%

Marchio: SITARCLEAN
Codice Min.: 025774011
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE DERMOCORTAL 5 MG/G **CREMA** **CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICA Corticosteroidi, deboli. **PRINCIPI ATTIVI** Idrocortisone 5 mg. **ECCIPIENTI** Palmito stearato di glicerolo e di polietilenglicole associato ad alcool cetilstearyllico poliossietilenato, gliceridi isostearici poliglicolisati, glicerolo monostearato, fenossietanolo, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, isostearato di isostearile, paraffina liquida, essenza profumata, acqua depurata. **INDICAZIONI** Punture d'insetti, pruriti o ustioni circoscritte, eczemi. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. L'uso dell'idrocortisone e' controindicato nel corso di affezioni virali, batteriche e fungine. **POSOLOGIA** Spalmare la crema sull'area colpita in strato sottile 2-3 volte al giorno, frizionando leggermente. In caso di mancata risposta alla terapia e' opportuno rivalutare la terapia. **CONSERVAZIONE** Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. **AVVERTENZE** La crema non trova impiego oftalmologico, ne' va applicata nelle zone perioculari. Da non usare nel prurito vulvare, se associato a perdite vaginali. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di irritazione o sensibilizzazione. In tal caso e' necessario interrompere il trattamento e stabilire una terapia idonea. Nei bambini al di sotto dei 2 anni di eta' il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessita'. Evitare le applicazioni prolungate soprattutto su ampie superfici. Possono essere riferiti disturbi visivi. Se un paziente si presenta con sintomi come visione offuscata o altri disturbi visivi, e' necessario considerare il rinvio a un oculista per la valutazione delle possibili cause che possono includere cataratta, glaucoma o malattie rare come la corioretinopatia sierosa centrale (CSCR), che sono state segnalate dopo l'uso di corticosteroidi sistemici e topici. Contiene metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato: possono causare reazioni allergiche (anche ritardate). **INTERAZIONI** Non sono note interazioni medicamentose con altri farmaci. **EFFETTI INDESIDERATI** Patologie dell'occhio: visione offuscata con frequenza non nota. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Nelle donne in stato di gravidanza il prodotto va somministrato nel caso di effettiva necessita'.