


## DESTIOR BRIDGE 30 COMPRESSE

**Marchio:** DESTIOR  
**Codice Min.:** 934864644  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DESTIOR BRIDGE** Descrizione Integratore alimentare a base di acido R-tioctico, Boswellia serrata e vitamine. Destior bridge è un prodotto nutrizionale contenente una molecola normalmente sintetizzata dall'organismo, l'acido tioctico o alfa-lipoico nella sua forma fisiologica R(+). L'acido R(+) tioctico/alfa-lipoico è sintetizzato nei tessuti ed è inoltre presente in taluni alimenti di normale consumo. La formulazione di Destior bridge contiene anche un fitosoma di Boswellia serrata che si avvale dell'azione modulatrice di questa sostanza, soprattutto in quelle condizioni che si connotano per ampia presenza di stress ossidativo. Sia l'acido R(+)-alfa-lipoico

che la Boswellia serrata concorrono al controllo antiossidante ed antiradicalico. La formulazione di Destior bridge contempla infine un apporto vitaminico: in particolare vitamina E, che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, e vitamine del gruppo B (B1 e B6) che contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso. Ingredienti Acido R(+) tioctico, Casperome [estratto di boswellia serrata Roxb. Ex Colebr., oleoresina, fosfolipidi di soia, cellulosa microcristallina, biossido di silicio (E551)], L-lisina, calcio fosfato anidro (E450), talco (E553b), sodio carbossimetilcellulosa reticolata, magnesio stearato (E470b), vitamina E (acetato di DL-alfa-tocoferile), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B1 (cloridrato di tiamina). Caratteristiche nutrizionali Valori medi2 compresse (dose giornaliera) %VNR\* Vitamina B10,0011 g100 Vitamina B60,0014 g 100 Vitamina E0,024 g200 Acido R(+) tioctico0,600 g- Casperome di cui boswellia serrata estrattodi cui fosfolipidi 0,500 g0,200 g0,165 g--- \*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento. Modalità d'uso 1 compressa al giorno. Avvertenze Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. In rari casi l'acido lipoico (tioctico) può dare ipoglicemia. Non essendoci studi specifici, si sconsiglia l'uso di Destior bridge durante la gravidanza e/o l'allattamento. La compressa può essere deglutita (non masticata) intera o spezzata, con l'aiuto di un liquido (acqua, succo di frutta, tè o altro). Si raccomanda di attenersi alle dosi indicate e di non eccedere nell'uso. L'utilizzo di integratori alimentari non è da intendersi quale sostitutivo di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Destior bridge contiene fosfolipidi di soia.Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Formato Confezione da 30 compresse da 1,02 g Peso netto: 30,6 g