

DIMILL*collirio 10 ml 0,01%

Marchio: DIMILL
Codice Min.: 032163014
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE DI MILL 0,1 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Oftalmologici antiinfettivi. **PRINCIPI ATTIVI** 1 ml contiene: benzalconio cloruro 0,1 mg. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **ECCIPIENTI** Sodio cloruro; acqua distillata sterile di Matricaria Chamomilla e di Hamamelis Virginiana; acqua depurata. **INDICAZIONI** Per la disinfezione dell'occhio anche irritato da polvere, fumo e smog. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Non usare in bambini al di sotto dei 12anni. **POSOLOGIA** Posologia: instillare due gocce di prodotto in ciascun occhio, due o tre volte al giorno. Non superare le dosi consigliate. **CONSERVAZIONE** Questo medicinale non richiede alcuna condizione

particolare di conservazione. **AVVERTENZE** Non usare per i trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti puo' avere conseguenze gravi, talvolta fatali (vedere paragrafo 4.9). In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente un medico. Evitare che la punta del contagocce venga a contatto con gli occhi. Il benzalconio cloruro puo' causare irritazione agli occhi. Eviti il contatto con lenti a contatto morbide. Tolga le lenti a contatto prima dell'applicazione e aspetti almeno 15 minuti prima di riapplicarle. E' nota l'azione decolorante nei confronti delle lenti a contatto morbide. Non usare mentre si indossano lenti a contatto. Il prodotto e' solo per uso esterno. E' da evitare l'applicazione in caso di infiammazioni, ferite o abrasioni corneali. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia. Di Mill contiene benzalconio cloruro. Dai limitati dati disponibili non ci sono differenze nel profilo di eventi avversi nei bambini rispetto agli adulti. Sono stati riportati casi di irritazione agli occhi, occhio secco, alterazione del film e della superficie corneali a seguito di somministrazione oftalmica di benzalconio cloruro. Da usare con cautela nei pazienti con occhio secco e con compromissione della cornea. I pazienti devono essere monitorati in caso di uso prolungato. **INTERAZIONI** Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti (surfattanti anionici, saponi, citrati, ioduri, nitrati, permanganati, tartrati, salicilati e sali d'argento). **EFFETTI INDESIDERATI** E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo:

avverse.GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non e' controindicato.