

## **DORMIPLANT\*50 cpr riv 160 mg + 80 mg**

**Marchio:** DR.WILLMAR  
SCHWABE

**Codice Min.:** 033892086

**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**DENOMINAZIONE**DORMIPLANT 160 MG + 80 MG**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**Ipnotici e sedativi.**PRINCIPI ATTIVI**Valeriana radice estratto secco; melissa foglie estratto secco.**ECCIPIENTI**Silice colloidale, saccarosio, crospovidone, olio di ricino idrogenato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, sciroppo di glucosio, calcio carbonato, talco, macrogol 1000, caramelloso sodico, polisorbato 80, macrogol 6000, povidone, ipromellosa, sodio dodecilsolfato, titanio diossido (E171), carminio d'indaco (E132), polietilacrilato metilacrilato, cera carnauba.**INDICAZIONI**Blando sedativo, anche per favorire il riposo notturno.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' individuale accertata verso i componenti del prodottoo sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico; generalmente controindicato in gravidanza e allattamento.**POSOLOGIA**1-2 compresse da assumere 2 volte al giorno, deglutite con acqua. Non superare le dosi consigliate. L'uso non e' consigliato nei bambini al di sotto dei 12 anni di eta'.**CONSERVAZIONE**Non conservare a temperatura superiore a 30 gradi C.**AVVERTENZE**Nei bambini al di sotto dei 12 anni l'uso del medicinale non e' consigliato. Se ne consiglia l'assunzione dopo i pasti principali e la sera prima di coricarsi. Il medicinale contiene olio di ricino idrogenato:puo' causare disturbi gastrici e diarrea. I pazienti affetti da rari problemi di malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale. Le compresse rivestite con film vanno deglutite con acqua.**INTERAZIONI**Non sono documentate in letteratura interazioni con altri medicinali. Tuttavia, verosimilmente, gli estratti di valeriana possono potenziare gli effetti depressivi sul sistema nervoso centrale indotti da altre sostanze, quali barbiturici e clorpromazina. Se ne deduce che l'impiego contemporaneo con psicofarmaci, barbiturici o sedativi maggiori e' sconsigliato. Gli effetti della valeriana e della melissa possono essere potenziati dall'alcol; e' pertanto sconsigliata l'assunzione contemporanea del medicinale e dosi eccessive di alcol.**EFFETTI INDESIDERATI**Potrebbero verificarsi disturbi gastrointestinali (es. nausea, crampi addominali). La frequenza non e' nota.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**In letteratura non esistono documentazioni su possibili controindicazioni in gravidanza o durante l'allattamento; e' verosimile, tuttavia, che tali condizioni non siano state esplicitamente investigate. Non avendo dati disponibili per valutare il profilo di sicurezza in caso di gravidanza dell'associazione valeriana e melissa, la somministrazione del farmaco non e' raccomandata in donne in stato di gravidanza o nella fase di allattamento.