

DROPYAL*20 monodosi collirio 0,65 ml 0,015 g/100 ml

Marchio: BRUSCHETTINI
Codice Min.: 028881011
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONEDROPYAL 0,015% COLLIRIO,
S O L U Z I O N E C A T E G O R I A
FARMACOTERAPEUTICAOftalmologici - Lacrime artificiali ed
altri preparati indifferenti.**PRINCIPI ATTIVI**100 ml contengono:
acido ialuronico sale sodico 0,015
g.**ECCIPIENTI**Carbossipolimetilene; glicerolo, acqua
distillata.**INDICAZIONI**Sindromi oculari da occhio secco.
Idratante e lubrificante della cornea e della congiuntiva. Valido
ausilio nell'uso delle lenti a
contatto.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita'
al principio attivo o ad uno qualsiasi degli

eccipienti.**POSOLOGIA**1-2 gocce quattro volte o piu'/die, secondo il parere del medico. Aprire un
microflaconcino monodose sterile facendo ruotare il segmento superiore del microflaconcino sterile,
istillare nel fornice congiuntivale inferiore il numero di gocce secondo la posologia indicata. Dopo
l'apertura e dopo la prima istillazione, richiudere il flaconcino premendo sul collo la capsula posta sotto
l'aletta. Il residuo puo' essere utilizzato non oltre 6 ore dall'apertura, purché sia conservato in ambiente
idoneo. Per evitare contaminazioni aver cura che il contagocce e la capsulina del microdosatore non
vengano a contatto con gli occhi o con altre superfici non sterili. Per utilizzare il microflaconcino
monodose eseguire le seguenti operazioni: staccare un flaconcino dalla striscia; scuotere il beccuccio
per liberarlo dal liquido; aprire il flaconcino monodose ruotando l'aletta e contemporaneamente tirando.
Tenere l'aletta in una mano; esercitando con l'altra mano una moderata pressione sulle pareti del
flaconcino monodose, far uscire lentamente a gocce il medicamento nella dose
prescritta.**CONSERVAZIONE**Conservare a temperatura non superiore a 30 gradi C.**AVVERTENZE**Per
evitare contaminazioni, il microflaconcino e la capsulina, una volta separati, non devono entrare a
contatto diretto con gli occhi o altre superfici.**INTERAZIONI**Non sono state mai segnalate interazioni con
l'uso di altri farmaci sistemici o topici.**EFFETTI INDESIDERATI**In rari casi, lieve bruciore transitorio
all'istillazione. Segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di
segnalazione.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Nessuna controindicazione nota.