

DULCOSOFT IRREGOLARITA' E GONFIORE POLVERE SOLUBILE 200 G

Marchio: DULCO
Codice Min.: 944159084
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DulcoSoft Irregolarità e Gonfiore Descrizione Dispositivo medico. Polvere per soluzione orale, viene utilizzato per il trattamento sintomatico della stitichezza, in quanto: - reidrata e ammorbidisce le feci dure; - aiuta ad avere evacuazioni intestinali regolari; - previene la formazione di fecalomi; - favorisce l'eliminazione dei gas, riducendo la sensazione di gonfiore e distensione addominale. Senza zucchero. Agisce entro 24-72 ore. Componenti Macrogol 4000, biossido di silicio, simeticone, sucralosio. Senza glutine. Senza lattosio. Modalità d'uso Utilizzare il misurino contenuto nella confezione per dosare la polvere: riempirlo raso e non pressato, quindi rimuovere la quantità di prodotto in eccesso con la lama di un coltello. 1 misurino così riempito corrisponde a circa 4,5 g di prodotto. - Adulti e bambini di età superiore ai 12 anni: da 2 a 5 misurini rasi al giorno. - Bambini di età

compresa tra 6 mesi e 12 anni: Peso corporeo Dose giornaliera da 6 a 10 kg 1 misurino raso da 10 a 15 kg 1-2 misurini rasi da 16 a 43 kg 2-4 misurini rasi La dose può essere aumentata o diminuita a seconda della risposta individuale al trattamento, senza superare la dose massima di 4 misurini rasi al giorno nei bambini fino a 12 anni e di 10 misurini rasi al giorno negli adulti e nei bambini sopra ai 12 anni. La dose appropriata è quella minima sufficiente a produrre la regolare evacuazione di feci morbide. Sciogliere la polvere in acqua o altra bevanda (50 ml per ogni misurino) e assumere immediatamente. Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere la dose minima (1 o 2 misurini al giorno). Per dosi maggiori suddividere l'assunzione tra mattino e sera. Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 7 giorni di trattamento, consultare il medico. È adatto ai diabetici in quanto non contiene zuccheri. Può essere usato nei pazienti che seguono una dieta a basso contenuto di sodio. Adatto per l'uso durante la gravidanza e l'allattamento; in queste situazioni, prima dell'uso si consiglia di consultare il medico. Avvertenze Si consiglia di utilizzare il prodotto in età pediatrica dopo aver consultato il medico. La somministrazione nei bambini deve essere effettuata sotto diretto controllo di un adulto. Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. Il prodotto può ridurre il tempo di permanenza nell'intestino e quindi l'assorbimento di medicinali ad uso orale. Si consiglia pertanto di assumere DulcoSoft Irregolarità e Gonfiore ad una distanza di almeno 2 ore dall'assunzione di altri farmaci ad uso orale. In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico. Non assumere in caso di ipersensibilità nota verso uno o più componenti, ileo paralitico, perforazione, ostruzione o stenosi intestinale, gravi malattie infiammatorie dell'intestino (es. colite ulcerosa, malattia di Crohn, megacolon tossico). L'uso dei lassativi è controindicato nel caso in cui siano presenti dolori addominali acuti o di origine sconosciuta, nausea e vomito, sanguinamento rettale di origine sconosciuta e in caso di grave stato di disidratazione. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. **EFFETTI INDESIDERATI:**

Potrebbero verificarsi alcuni disturbi gastro-intestinali (mal di pancia, flatulenza, gonfiore addominale, nausea e incontinenza fecale). La diarrea è una conseguenza dell'assunzione di dosi eccessive di DulcoSoft Irregolarità e Gonfiore ed è evitabile diminuendo la dose di assunzione. Sono stati riportati, raramente, casi di reazioni da ipersensibilità (rash cutaneo), a seguito dell'utilizzo di prodotti contenenti macrogol. Nel caso, sospendere il trattamento e consultare il medico. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore. Richiudere accuratamente dopo l'uso. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato. Formato Barattolo da 200 g con misurino.