

ELMEX*gel dentale 25 g

Marchio: ELMEX
Codice Min.: 026487013
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONEELMEX 30,32 MG/G / 2,87 MG/G / 22,1MG/G GEL DENTALE**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**Sostanza impiegata nella profilassi della carie.**PRINCIPI ATTIVI**100 g di gel dentale contengono: diidrofluoruro di bis-(idrossietil)-ammino-propil-N-idrossietil-ottadecilammina 3,032 g, idrofluoruro di ottadecilammina 0,287 g, fluoruro sodico 2,210 g, (contenuto totale in fluoruro = 1,25%). Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.**ECCIPIENTI**Glicole propilenico, idrossietilcellulosa, saccarina, olio di menta verde, aroma di menta piperita, aroma di mela, DL-mentone, acqua purificata.**INDICAZIONI**ELMEX e' indicato negli adulti e nei bambini dai 6 anni di eta' per: profilassi della carie soprattutto in soggetti predisposti ad essa, ipersensibilita' del colletto dentario, decalcificazione dello

smalto causata da ferule amovibili, protesi parziali, apparecchi ortodontici, fluorizzazione topica dello smalto dentale.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARE**ELMEX non deve essere usato nei casi di: ipersensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1; alterazioni desquamative patologiche della mucosa orale (erosione dell'epitelio); fluorosi ossea e/o dello smalto dentale; se il riflesso della deglutizione e' compromesso o non ancora completamente sviluppato; bambini di eta' inferiore ai 6 anni di eta' (vedere paragrafo 4.2).**POSOLOGIA**Posologia. Uso domestico: una volta alla settimana applicare all'incirca 1-2 cm di ELMEX (ca. 0.5 g di gel dentale corrispondente a 6.25 mg di fluoruro) sullo spazzolino e spazzolare a fondo i denti. E' sufficiente usare ELMEX utilizzando un normale spazzolino per la durata di 2-3 minuti, risciacquando normalmente. Il tempo totale di applicazione (tempo di spazzolamento e di residenza) non deve superare 5 minuti. **Usor**riservato al medico dentista: ELMEX puo' essere spalmato sui denti mediante lo spazzolino rotante, oppure con un batuffolo di cotone. Particolarmente efficace e di effetto duraturo e' l'applicazione mediante un porta-impronta in materiale plastico o di cera. Deve essere mantenuto un adeguato tempo di contatto del gel dentale con i denti (almeno 2-4 minuti). Tuttavia non superare i 5 minuti. Risciacquare la bocca dopo l'uso. Con la cannula smussata di una siringa monouso riempita di gel applicare il prodotto direttamente sulle superfici masticatorie e negli spazi interdentali (da 0.5 a 1 g di ELMEX, corrispondenti a una quantita' di fluoruro compresa tra 6.25 e 12.5 mg). Con porta-impronta si applicano all'incirca 6-8 g di ELMEX, corrispondenti a circa 75-100mg di fluoruro. **Popolazione pediatrica:** ELMEX e' controindicato nei bambini di eta' inferiore ai 6 anni (vedere paragrafo 4.3). A causa del rischio di sovradosaggio e conseguente intossicazione, l'applicazione di ELMEX con porta-impronta non e' consigliata nei bambini di eta' inferiore agli 8 anni. **Modo di somministrazione:** per uso dentale.**CONSERVAZIONE**Nessuna speciale precauzione per la conservazione.**AVVERTENZE**ELMEX non e' indicato per persone in cui il controllo del riflesso della deglutizione e' compromesso o non ancora

