

EMORSAN RAG 2 TUBI 30 ML + 30 ML

Marchio: DEPOFARMA
Codice Min.: 972260590
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Emorsan Rag Descrizione Trattamento coadiuvante delle ragadi anali. Emorsan Rag favorisce il fisiologico processo di guarigione e cicatrizzazione della ragade, grazie alle proprietà filmogene dei suoi componenti che esplicano un'azione barriero-protettiva nei confronti della mucosa anale. Il prodotto fornisce un sollievo sintomatico attenuando prurito, bruciore e dolore anale, in presenza di ragadi. Modalità d'uso Lavarsi le mani con un detergente neutro prima dell'uso. Lavare accuratamente e delicatamente la parte interessata, meglio se con un detergente intimo specifico. Svitare il tappo del tubo.

Perforare il sigillo utilizzando il retro del tappo. Rimuovere l'involucro trasparente protettivo dell'applicatore. Avvitare l'applicatore rettale sull'apertura del tubo. Togliere il cappuccio protettivo e premere il tubo fino a completo riempimento dell'applicatore, facendo fuoriuscire una quantità di prodotto sufficiente a lubrificare l'applicatore stesso. Con delicatezza, inserire l'applicatore nel retto. Premere il tubo fino ad introdurre una piccola quantità di prodotto. Sfilare delicatamente l'applicatore dal retto. Applicare una piccola dose di prodotto anche nella zona esterna. Dopo l'utilizzo, svitare l'applicatore dal tubo, pulirlo sotto acqua corrente tiepida fino a completa rimozione dei residui di gel e richiuderlo con l'apposito cappuccio protettivo. Chiudere il tubo avvitando il tappo. Si consiglia di applicare Emorsan Rag 2 volte al giorno per 15-20 giorni. Componenti Aqua, Glycerin, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Phenoxyethanol, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Propylene Glycol, Mannitol, Polyacrylic Acid, Sodium Dehydroacetate, Benzoic Acid, Lactic Acid, Dehydroacetic Acid, Caprylyl Glycol, Helichrysum Italicum Extract, Chamomilla Recutita Extract, Sodium Citrate, Ethylhexylglycerin, Acetyl Hexapeptide-8, Acetyl Tetrapeptide-15, P. Acnes Lysate. Avvertenze Se la sintomatologia persiste consultare il medico. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Non utilizzare se la confezione non è integra. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per l'applicazione in bambini di età inferiore a 12 anni e nelle donne in gravidanza si consiglia di consultare il medico. I residui di prodotto possono essere considerati come rifiuti domestici e smaltiti in accordo alla legislazione vigente. I componenti non devono essere dispersi nell'ambiente. Il prodotto non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità accertata verso uno dei componenti. Conservazione Conservare lontano da fonti di calore e ad una temperatura compresa tra 5 °C e 30 °C. Formato Confezione contenente 2 tubi da 30 ml e 2 applicatori rettali.