

ENTEROGERMINA 2 MILIARDI PER 5 ML SOSPENSIONE ORALE 20 FLACONCINI DA 5 ML

Marchio: Sanofi Aventis
Codice Min.: 013046040
Link: [clicca qui per acquistare](#)

ENTEROGERMINA 2 MILIARDI PER 5 ML SOSPENSIONE ORALE 20 FLACONCINI DA 5 ML



Questo prodotto è un farmaco senza obbligo di ricetta (OTC - SOP), Farmajet ti informa che è importante leggere sempre il foglietto illustrativo e le avvertenze prima dell'utilizzo.

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA:
Microrganismi antidiarroidici.

PRINCIPI ATTIVI:

Spore di *Bacillus clausii* poliantibiotico resistente.

ECCIPIENTI:

Flaconcini: acqua depurata.

INDICAZIONI:

Cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene. Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici. Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi.

CONTROINDICAZIONI/EFFETTI SECONDARI:

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

POSOLOGIA:

Adulti: 2-3 flaconcini al giorno o 2-3 capsule al giorno.

Bambini: 1-2 flaconcini al giorno o 1-2 capsule al giorno.

Lattanti: 1-2 flaconcini al giorno.

Flaconcini: somministrazione ad intervalli regolari (3-4 ore), assumendo il contenuto del flaconcino tale quale o diluendo in acqua o altre bevande (ad es.

latte, the, aranciata).

CONSERVAZIONE:

Conservare a temperatura non superiore a 30 gradi C.

AVVERTENZE:

L'eventuale presenza di corpuscoli visibili nei flaconcini e' dovuta a d aggregati di spore di Bacillus clausii; non e' pertanto indice di prodotto alterato. Agitare il flaconcino prima dell'uso. Nel corso di terapia antibiotica si consiglia di somministrare il preparato nell'intervallo fra l'una e l'altra somministrazione di antibiotico.

INTERAZIONI:

Non sono note eventuali interazioni medicamentose a seguito di concomitante somministrazione di altri medicinali.

EFFETTI INDESIDERATI:

Sono stati riportati casi di reazioni di ipersensibilita', compresi rash e orticaria.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO:

Non esistono preclusioni all'uso del preparato in gravidanza o durante l'allattamento.