

## ENTEROGERMINA\*orale sosp 20 flaconcini 4 mld 5 ml

**Marchio:** ENTEROGERMINA  
**Codice Min.:** 013046089  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**DENOMINAZIONE**ENTEROGERMINA 4 MILIARDI / 5 ML SOSPENSIONE ORALE**CATEGORIA**  
**FARMACOTERAPEUTICA**Antidiarroici, antinfiammatori ed antimicrobici intestinali.**PRINCIPI ATTIVI**Un  
flaconcino contiene il principio attivo: spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente (ceppi SIN, O/C, T,  
N/R) 4 miliardi. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.**ECCIPIENTI**Flaconcini:  
acqua depurata.**INDICAZIONI**Cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi  
endogene. Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di  
trattamenti antibiotici o chemioterapici. Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad  
intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a  
disvitaminosi.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno  
qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.**POSOLOGIA**Posologia. Adulti: 1 flaconcino al giorno.  
Lattanti e bambini: 1 flaconcino al giorno. Modo di somministrazione: assumere il contenuto del  
flaconcino tal quale o diluendo in acqua o altre bevande (ad es. latte, the, aranciata). Questo medicinale  
e' per esclusivo uso orale. Non iniettare ne' somministrare in nessun altro modo (vedere paragrafo  
4.4).**CONSERVAZIONE**Conservare a temperatura inferiore a 30 gradi C.**AVVERTENZE**Avvertenze  
speciali. Batteriemia/sepsi: dopo l'immissione in commercio sono stati segnalati casi di batteriemia,  
setticemia e sepsi in pazienti immunocompromessi o gravemente malati e in neonati pretermine.  
Nel caso di alcuni pazienti malati in condizioni critiche, l'esito e' stato fatale. Enterogermina deve essere  
evitato in questi gruppi di pazienti (vedere paragrafo 4.8). Questo medicinale e' solo per uso orale. Non  
iniettare o somministrare per altre vie. Un uso non corretto del medicinale ha provocato reazioni  
anafilattiche gravi come shock anafilattico. Precauzioni d'impiego: nel corso di terapia antibiotica si  
consiglia di somministrare il preparato nell'intervallo fra l'una e l'altra somministrazione di antibiotico.  
L'eventuale presenza di corpuscoli visibili nei flaconcini di Enterogermina e' dovuta ad aggregati di spore  
di Bacillus clausii; non e' pertanto indice di prodotto alterato. Agitare il flaconcino prima  
dell'uso.**INTERAZIONI**Non sono stati effettuati studi di interazione.**EFFETTI INDESIDERATI**Durante il  
trattamento con questo medicinale sono stati osservati i seguenti effetti indesiderati, classificati secondo  
la classificazione MedDRA per classe di organi e in base alle seguenti classi di frequenza: molto  
comune ( $\geq 1/10$ ); comune ( $\geq 1/100, = 1/1.000, = 1/10.000$ ), **GRAVIDANZA E**  
**ALLATTAMENTO**Gravidanza: non sono disponibili dati relativi all'uso di Enterogermina in donne in  
gravidanza; pertanto non e' possibile trarre conclusioni sulla sicurezza dell'uso di Enterogermina durante  
la gravidanza. Enterogermina deve essere usata durante la gravidanza solo se i potenziali benefici per la  
madre superano i potenziali rischi, compresi quelli per il feto. Allattamento: non sono disponibili dati  
relativi all'uso di Enterogermina durante l'allattamento relativamente alla composizione del latte materno  
e agli effetti sul bambino. Non e' possibile trarre conclusioni sulla sicurezza dell'uso di Enterogermina  
durante l'allattamento. Enterogermina deve essere usata durante l'allattamento solo se i potenziali

benefici per la madre superano i potenziali rischi, compresi quelli per il bambino allattato al seno.  
Fertilita': non sono disponibili dati sull'effetto di Enterogermina sulla fertilita' umana.