

EPAREMA*30 cpr riv 70 mg + 20 mg + 10 mg

Marchio: EPAREMA
Codice Min.: 009677016
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE EPAREMA **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Lassativi. **PRINCIPI ATTIVI** Sciroppo: 100 ml di sciroppo contengono cascara sagrada estratto fluido 14,5 g; boldo estratto fluido 4,5 g; rabarbaro cinese estratto fluido 2,5 g. Compresse rivestite: cascara sagrada estratto secco 70 mg, boldo fragrans estratto secco 20 mg, rabarbaro cinese estratto secco 10mg. **ECCIPIENTI** Sciroppo: glicerina, metil-p-idrossibenzoato, alcool etilico 96[^], saccarosio, tintura vaniglia, tintura arancio, amaro G.M., acqua depurata. Compresse rivestite: silice precipitata, amido, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, colore E 124, etilcellulosa, glicerina, gomma arabica, gomma lacca, magnesio stearato, saccarosio, talco. **INDICAZIONI** Stitichezza. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' verso il prodotto. Ostruzione meccanica delle vie biliari. Epatopatie acute e croniche. Calcolosi biliare. Insufficienza epatica. **POSOLOGIA** Compresse rivestite: 1-2 compresse rivestite al giorno prima dei pasti principali. Non superare le dosi consigliate. Sciroppo. **Adulti:** un cucchiaino diluito in acqua prima di ciascuno dei due pasti principali. **Bambini:** la dose e' di un solo cucchiaino da caffe' al giorno, prima del pasto serale. Non superare le dosi consigliate. **CONSERVAZIONE** Non sono necessarie speciali precauzioni per la conservazione. **AVVERTENZE** L'uso continuativo di lassativi puo' provocare assuefazione o danno di diverso tipo. Non usare lassativi se sono presenti dolori addominali, nausea e vomito. Se la stipsi e' ostinata consultare il medico. Il prodotto in particolare lo sciroppo contiene saccarosio; di cio' si tenga conto in caso di diabete o di diete ipocaloriche. **Avvertenze:** non usare per trattamenti protratti. Dopo breve periodo di trattamento, senza risultati apprezzabili, consultare il medico. **Validita' del preparato:** attenzione non utilizzare il preparato oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. Un leggero precipitato sul fondo del flacone e' dovuto agli estratti vegetali e non e' indice di alterazione del prodotto. **INTERAZIONI** Non sono note. **EFFETTI INDESIDERATI** In soggetti particolarmente sensibili possono insorgere dolori addominali che di norma scompaiono con la riduzione della posologia. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** In gravidanza il prodotto va assunto nei casi di effettiva necessita' sotto il diretto controllo del medico mentre se ne sconsiglia l'uso durante l'allattamento perche' gli antrachinonici vengono escreti in parte col latte materno conferendogli proprieta' purgative.