

ESSAVEN*gel 40 g 10 mg/g + 8 mg/g

Marchio: ESSAVEN
Codice Min.: 036193011
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE ESSAVEN 10 MG/G + 8 MG/G
G E L C A T E G O R I A
FARMACOTERAPEUTICA Vasoprotettori. PRINCIPI
ATTIVI 100 g contengono: escina 1 g, fosfatidilcolina
0,8 g. ECCIPIENTI Isopropanolo, glicerolo,
trietanolamina, carbopol 940, acqua di colonia,
rosmarino essenza, lavanda essenza, acqua
depurata. INDICAZIONI Sintomi attribuibili ad

insufficienza venosa; stati di fragilita' capillare. CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARIipersensibilita'
ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Essaven non deve essere spalmato sulle ferite
cutanee aperte, suglieczemi e sulle mucose (anale, ecc.). POSOLOGIA Applicare il preparato 3 volte al
giorno, spalmando in corrispondenza delle regioni dolorose e rigonfie, distribuendo uniformemente il gel
fino ad assorbimento, anche sulle parti circostanti, senza necessita' di massaggiare. Non superare le
dosi consigliate. CONSERVAZIONE Tenere lontano da fonti di calore. AVVERTENZE Evitare il contatto
con gli occhi. Solo per uso esterno. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare
origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove cio' si verifici, interrompere il trattamento ed istituire una
terapia idonea. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. INTERAZIONI Nessuna nota
finora. EFFETTI INDESIDERATI In casi molto rari si possono verificare reazioni allergiche, quali
ad esempio esantema o rash e orticaria. Prurito (frequenza non conosciuta). Eventuali arrossamenti
cutanei, per altro estremamente rari, scompaiono spontaneamente sospendendo l'applicazione del
preparato. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO L'uso del preparato in caso di gravidanza e di allattamento
non e' controindicato.