

ESSAVEN*gel 80 g 10 mg/g + 8 mg/g

Marchio: ESSAVEN
Codice Min.: 036193023
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE ESSAVEN 10 MG/G + 8 MG/G **GEL** **CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICA Vasoprotettori. **PRINCIPI ATTIVI** 100 g contengono: escina 1 g, fosfatidilcolina 0,8 g. **ECCIPIENTI** Isopropanolo, glicerolo, trietanolamina, carbopol 940, acqua di colonia, rosmarino essenza, lavanda essenza, acqua depurata. **INDICAZIONI** Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilita' capillare. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Essaven non deve essere spalmato sulle ferite cutanee aperte, suglieczemi e sulle mucose (anale, ecc.). **POSOLOGIA** Applicare il preparato 3 volte al giorno, spalmando in corrispondenza delle regioni dolorose e rigonfie, distribuendo uniformemente il gel fino ad assorbimento, anche sulle parti circostanti, senza necessita' di massaggiare. Non superare le dosi consigliate. **CONSERVAZIONE** Tenere lontano da fonti di calore. **AVVERTENZE** Evitare il contatto con gli occhi. Solo per uso esterno. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove cio' si verifici, interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico. Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. **INTERAZIONI** Nessuna nota finora. **EFFETTI INDESIDERATI** In casi molto rari si possono verificare reazioni allergiche, quali ad esempio esantema o rash e orticaria. Prurito (frequenza non conosciuta). Eventuali arrossamenti cutanei, per altro estremamente rari, scompaiono spontaneamente sospendendo l'applicazione del preparato. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** L'uso del preparato in caso di gravidanza e di allattamento non e' controindicato.