

## EUCLORINA\*10 bust polv u.e. 2,5 g

**Marchio:** EUCLORINA  
**Codice Min.:** 032056020  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE** EUCLORINA 2,5 G POLVERE SOLUBILE  
**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Antisettici e disinfettanti.  
**PRINCIPI ATTIVI** Ogni bustina contiene: cloramina 2,5 g.  
**ECCIPIENTI** Nessuno.  
**INDICAZIONI** Euclorina polvere solubile viene impiegata per lavaggi e impacchi nella: disinfezione della cute e medicazione di lesioni superficiali di piccole dimensioni, abrasioni, piaghe da decubito con interessamento limitato all'epidermide. Disinfezione dei genitali esterni.  
**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo, ad altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico o ad uno qualsiasi degli

**eccipienti.**  
**POSOLOGIA** Disinfezione e pulizia della cute: 4 bustine in 1 litro di acqua (oppure 1 bustina in 250 ml di acqua). Disinfezione dei genitali esterni: 1 bustina in 1 litro di acqua. 1 applicazione al di' salvo diversa valutazione medica.  
**CONSERVAZIONE** Conservare a temperatura inferiore a 30 gradi C.  
**AVVERTENZE** Il prodotto e' solo per uso esterno e non deve essere utilizzato per trattamenti prolungati. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, e' necessaria la valutazione medica. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti puo' avere conseguenze gravi, talvolta fatali.  
**INTERAZIONI** Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti  
**EFFETTI INDESIDERATI** E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione) che non richiede modifica del trattamento. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.  
**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Nelle donne in gravidanza e durante l'allattamento al seno, il medicinale va somministrato in caso di effettiva necessita' e sotto il diretto controllo medico.