

FALVIN*crema 30 g 2%

Marchio: FALVIN
Codice Min.: 025982012
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONEFALVIN CREMA - SPRAY CUTANEO, SOLUZIONE**CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICAAntimicotici per uso topico.**PRINCIPI ATTIVI**Fenticonazolo
nitrato.**ECCIPIENTI**Crema 2%: glicole propilenico; lanolina idrogenata; olio di mandorla raffinato; estere
poliglicolico di acidi grassi; alcool cetilico; gliceril monostearato; sodio edetato; acqua depurata. Spray
cutaneo, soluzione 2%: alcool; glicole propilenico; acqua depurata.**INDICAZIONI**Dermatomicosi da
dermatofiti (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton) a diversa localizzazione: tinea capitis, tinea
corporis, tinea cruris, tinea pedis (piede d'atleta), tinea manuum, tinea faciei, tinea barbae, tinea
unguium; candidiasi della pelle (intertrigo, perleche, candidiasi facciale, candidiasi "da pannolino",
perineale e scrotale); balaniti, balanopostiti; onichia e paronichia; pityriasis versicolor (daPityrosporum
orbiculare e P. ovale); otomicosi (da Candida o da muffe), solo se non sono presenti lesioni del timpano;
eritrasma; micosi con superinfezioni batteriche (da batteri Gram-
positivi).**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi
degli eccipienti elencati; gravidanza.**POSOLOGIA**Il medicinale va applicato 1-2 volte al giorno, secondo
parere medico,dopo aver lavato ed asciugato la parte lesa, utilizzando la formulazione adatta alla
localizzazione della lesione. Crema 2%: e' indicata per il trattamento della cute glabra, delle pieghe
cutanee e delle mucose; si applica frizionando leggermente. L'uso preferenziale della cremae' per le
micosi secche: pityriasis versicolor, eritrasma, onicomicosi (nelle onicomicosi la crema va applicata con
bendaggio occlusivo); la crema e' adatta all'impiego nelle micosi genitali maschili. Spray cutaneo,
soluzione 2%: e' indicato per le localizzazioni al cuoio capelluto e per le zone cutanee ricoperte da peli.
Lo spray cutaneo soluzione, inoltre, e' di facile e comodo impiego per le micosi estese e per le zone
difficilmente raggiungibili. Il farmaco non unge, non macchia ed e' facilmente asportabile con
acqua.**CONSERVAZIONE**Conservare a temperatura inferiore ai 25 gradi C.**AVVERTENZE**Al momento
dell'applicazione sulla lesione si puo' riscontrare una modesta sensazione di bruciore che scompare
rapidamente. L'uso, specie seprolungato, dei prodotti per uso topico, puo' dare origine a fenomenidi
sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e istituire idonea terapia. La crema e lo spray
cutaneo, soluzione contengonoglicole propilenico. Possono causare irritazione cutanea. La crema
contiene alcool cetilico. Puo' causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto). Contiene
anche lanolina idrogenata. puo' causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da
contatto).**INTERAZIONI**Nessuna conosciuta.**EFFETTI INDESIDERATI**Quando usato come
raccomandato, il medicinale e' solo scarsamente assorbito e non sono previsti effetti indesiderati
sistemici. L'uso prolungato dei prodotti per uso topico puo' causare fenomeni di sensibilizzazione.
Nell'elenco sottostante sono riportati gli effetti indesiderati, elencati in base alla classificazione per
sistemi e organi secondo MedDRA e in base alla frequenza: molto comune ($\geq 1/10$); comune ($\geq 1/100$,
 $\geq 1/1.000$, $\geq 1/10.000$, **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Benche' l'assorbimento percutaneo del

fenticonazolo sia piuttosto scarso, si consiglia di non usare il medicinale in gravidanza.