

FERTOMCIDINA U*soluz cutanea 100 ml 17,5 mg/ml + 30,00 mg/ml

Marchio: THERIACA SRL
Codice Min.: 033205016
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONEFERTOMCIDINA "U" 17,5 MG/ML + 30,00 MG/ML SOLUZIONE CUTANEA
CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICAAntisettici e disinfettanti (derivati dello Iodio).
PRINCIPI ATTIVI100 ml di soluzione contengono: principi attivi: acido salicilico 1,75g, sodio ioduro 3 g. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
ECCIPIENTIBromuro di ammonio, fosfato di magnesio bibasico, acqua depurata.
INDICAZIONIDisinfezione e pulizia della cute in caso di lesioni superficiali di piccole dimensioni.
CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARIipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 Disordini tiroidei. Gravidanza e allattamento (vedere paragrafo 4.6).
POSOLOGIAPosologia: applicare una piccola quantità di prodotto sulla zona da trattare. Se necessario ripetere l'operazione 2-3 volte al giorno. Non superare il numero raccomandato di applicazioni giornaliere. Modo di somministrazione: uso topico. Applicare la soluzione sulla zona da trattare tramite tocature, impacchi o lavaggi.
CONSERVAZIONEConservare in recipienti ben chiusi, protetti dalla luce e dal calore.
AVVERTENZEIl prodotto è solo per uso topico. Non utilizzare per trattamenti prolungati, in assenza di valutazione clinica (vedere paragrafo 4.8). L'uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso è necessario interrompere il trattamento ed effettuare una valutazione medica. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti possono avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare l'impiego su superfici ampie. Non applicare con bendaggio occlusivo. Evitare il contatto con gli occhi. Per eliminare eventuali macchie sui tessuti è sufficiente usare l'acqua; evitare l'uso di sapone.
INTERAZIONIEvitare l'uso contemporaneo con qualsiasi altro prodotto ed in particolare creme o gel. Non usare sotto guttaperca o altre sostanze impermeabili. Non applicare sulla parte trattata contemporaneamente sali di mercurio o composti di benzoino.
EFFETTI INDESIDERATIÈ possibile il verificarsi di intolleranza (bruciore o irritazione) che non richiede la modifica del trattamento. La reazione dello iodio con i tessuti lesi può ritardarne la cicatrizzazione. L'applicazione su ustioni o abrasioni estese può produrre gli effetti sistemici dello iodio. Può interferire con le prove di funzionamento tiroideo. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTOLo iodio viene assorbito per via sistemica specialmente in caso di ulcere. Lo iodio assorbito può attraversare la barriera placentare ed essere escreto nel latte, pertanto l'uso di Fertomcidina "U" è controindicato in gravidanza e durante l'allattamento con latte materno.