

FOILLE INSETTI*crema derm 15 g 0,5%

Marchio: FOILLE
Codice Min.: 020051037
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE FOILLE INSETTI 0,5 G/100 G
CREMA CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Dermatologici, corticosteroidi, deboli (gruppo I).
PRINCIPI ATTIVI 100 g di crema contengono: idrocortisone 0,5 g.
ECCIPIENTI Alcool isopropilico, alcool cetilico, alcool stearilico, lanolina, macrogol 1000 stearato, macrogol 4000 stearato, macrogol 6000 stearato, aroma mandorle amare e acqua depurata.
INDICAZIONI Punture d'insetti, pruriti, eritemi e eczemi.
CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARIipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. L'uso dell'idrocortisone e' controindicato nel caso di affezioni virali,

batteriche e fungine.
POSOLOGIA Frizionando leggermente, spalmare la crema sulla parte interessata in strato sottile, due volte al giorno. Non superare le dosi consigliate.
CONSERVAZIONE Conservare a temperatura inferiore a 25 gradi C.
AVVERTENZE Il farmaco deve essere impiegato solo per uso esterno. Non applicare sulle mucose. Evitare il contatto con gli occhi. Nei bambini di eta' inferiore a 2 anni. Il medicinale deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. E' buona norma evitare un uso prolungato, in particolare su ampie superfici. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni d'irritazione o di sensibilizzazione. In tale caso, e' necessario interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire un'idonea terapia. Qualora comparisse irritazione cutanea e' necessario sospendere il trattamento. Dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. Si sono verificati casi di crisi di feocromocitoma, che possono essere fatali, dopo somministrazione di corticosteroidi. I corticosteroidi devono essere somministrati a pazienti con sospetto o accertato feocromocitoma, solo dopo una adeguata valutazione del rischio/beneficio. Disturbi visivi. Con l'uso di corticosteroidi sistemici e topici possono essere riferiti disturbi visivi. Se un paziente si presenta con sintomi come visione offuscata o altri disturbi visivi, e' necessario considerare il rinvio ad un oculista per la valutazione delle possibili cause che possono includere cataratta, glaucoma o malattie come la corioretinopatia sierosa centrale (CSCR), che sono state segnalate dopo l'uso di corticosteroidi sistemici e topici. Foille Insetti contiene alcool cetilico, alcool stearilico e lanolina che possono causare reazioni cutanee locali (ad esempio dermatite da contatto).
INTERAZIONI Nessuna nota.
EFFETTI INDESIDERATI Come per tutti i preparati per uso topico e' possibile che si verifichino reazioni locali di sensibilizzazione. In linea generale, l'applicazione topica di corticosteroidi non determina evidenze cliniche di assorbimento sistemico. Quando applicato su superfici estese, o per periodi prolungati di tempo, o su cute non integra, o in caso di bendaggio occlusivo, l'idrocortisone puo'

essere assorbito in quantità sufficienti a determinare effetti sistemici. Effetti indesiderati dovuti ai Corticosteroidi. La frequenza degli effetti indesiderati è classificata come segue: molto comune ($\geq 1/10$); comune ($\geq 1/100$, = $1/1.000$, = $1/10.000$, GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO) Da usare sotto il diretto controllo del medico.